

GAM Online Reporting Tool

República Dominicana - 2017

I Portada

1) ¿Qué instituciones/entidades fueron responsables de completar los formularios de indicadores?

a) Comité Nacional de Sida o equivalente: Sí

b) Programa Nacional de Sida: Sí

c) Otros: No

Si son otros, especifique:

2) Con la colaboración de

Ministerio de Educación: Sí

Ministerio de Salud: Sí

Ministerio de Trabajo: Sí

Ministerio de Asuntos Exteriores: Sí

Otro Ministerio: Sí

Si es otro Ministerio, especifique: Ministerio de Juventud, Gabinete de Políticas Sociales de la Vice Presidencia, Servicio Nacional de Salud, Procuraduría General de la Republica.

Organizaciones de la sociedad civil: No

Personas que viven con el VIH: No

Sector privado: No

Organizaciones de Naciones Unidas: No

Organizaciones bilaterales: No

ONG internacionales: No

Otros: No

Si son otros, especifique:

3) ¿Se dialogó sobre el informe en un gran foro?: Sí

4) ¿Están los resultados de la encuesta almacenados centralmente?: Sí

5) ¿Están disponibles los datos para su consulta pública?: Sí

6) ¿Quién es la persona responsable del envío del informe?

Nombre(s) / puesto(s):: Dra. Rosa Sanchez/Coordinadora de M&E y Sistemas de Información del CONAVIHSIDA

Dirección(es):: Consejo Nacional para el VIH y SIDA Av. Ortega & Gasette, Plaza de la Salud, Edif. No. 4, Santo Domingo, Republica Dominicana

Correo(s) electrónico(s):: rsanchez@conavihsida.gob.do

Teléfono(s):: 8097327772

II Reporte narrativo

Visión general: La Respuesta Nacional al VIH y al Sida de la República Dominicana ha evidenciado notables avances con el transcurrir de los años y su compromiso con el impulso de acciones y con la adopción de medidas adecuadas para el logro de las metas asumidas, tanto en el plano local como en el plano internacional.

COMPROMISO 1. Garantizar que 30 millones de personas que viven con el VIH tengan acceso a tratamiento cumpliendo con los objetivos 90-90-90 para el año 2020: En el Plan Estratégico Nacional 2015 - 2018, plantea la gradualidad para implementar los objetivos 90-90-90, y las acciones que deben tomarse para lograr cumplir con los mismos. Se han adaptado las Guías de Atención para orientar los procesos de elegibilidad a ARV, así como el fortalecimiento de los mecanismos para el monitoreo continuo de la atención. A la fecha, las Guías Nacionales han adoptado parcialmente las Recomendaciones de la OMS para cumplir con el "Tratamiento para Todo". Con las guías actuales la entrada a tratamiento es con niveles de CD4 inferior a 500, y entran tan pronto son diagnosticados Embarazadas, Poblaciones clave (Hombres que tienen sexo con hombres, Trans, trabajadoras sexuales, usuarios de drogas), niños menores de 5 años, Personas mayores de 50 años, parejas serodiscordante, Personas que debuten con una neoplasia y deterioro de las funciones renales y personas con una co-morbilidad. La expansión del diagnóstico y tratamiento tempranos combina los beneficios clínicos individuales del tratamiento temprano con los beneficios de prevención de la transmisión a nivel de población con mayor riesgo. En estos momentos se encuentran en la actualización de la Guía Nacional de Atención al VIH, para lograr tratamiento para todos. Además, existe una intervención especial en 9 servicios de atención integral donde se inicia tratamiento de manera inmediata para toda la población. La cobertura de ARV se incrementó de 41% (2015) a 49% (junio 2017). Se ha producido un aumento en la cascada de atención: a finales del 2015 60% PVVIH conocían su estado serológico; 41% estaban en ARV y 27% se mantenían con carga viral indetectable. A finales del 2017, la cascada era: 76.83%; 52%; 26.8% sucesivamente.

COMPROMISO 2. Eliminar nuevas infecciones infantiles de VIH para el año 2020 a la vez que se garantiza que 1,6 millones de niños tengan acceso a tratamiento para el VIH para el año 2018: Los resultados principales de la evaluación intermedia de la evaluación del Plan Estratégico para la Eliminación de la Transmisión Materno-Infantil (ETMI) señalaron la necesidad de ampliar la prueba del VIH a todos los centros de salud, incluidas las unidades de atención primaria, y de implementar todos los servicios las intervenciones previstas por el PNTMI. Existe el compromiso de fortalecer el enfoque de derechos humanos entre el personal de salud con el fin de evitar el estigma y la discriminación contra las personas afectadas por el VIH y mantener la confidencialidad. La necesidad de introducir un sistema de control de calidad en los laboratorios, así como la necesidad de vincular los sistemas de información del recién nacido y la madre, se consideraron prioritarias para los próximos años. Debido a los resultados explicados anteriormente, el UNICEF y la OPS apoyan a los Servicios Nacionales de Salud fortaleciendo la capacidad de los médicos en la Asesoría, la prueba del VIH y la derivación de las mujeres embarazadas VIH positivas en el Centro de Salud. Es necesario proseguir el duro trabajo sobre la PTMI a fin de reducir la transmisión de madre a hijo, que es del 4,4%.

COMPROMISO 3. Garantizar el acceso a opciones de prevención combinada, entre ellas profilaxis previa a la exposición, circuncisión masculina médica voluntaria, reducción de daños, y preservativos, para como mínimo el 90% de las personas de aquí a 2020, especialmente mujeres jóvenes y niñas adolescentes en países con alta prevalencia y grupos de población clave (los hombres gay y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, las personas transgénero, los profesionales del sexo y sus clientes, las personas que consumen drogas inyectables y los presos): La Respuesta Nacional al VIH ha trabajado arduamente con el propósito de alcanzar las poblaciones clave (trabajadoras sexuales, hombres que tienen sexo con hombres, TRANS, mujeres en situación de vulnerabilidad, y migrantes) con medidas de prevención combinadas. Entregando paquetes de prevención que incluye lo siguiente: Entrega de condones, lubricantes, Orientaciones a través de charlas informativas y referimiento a realizarse la prueba. Además, existe una Disposición Ministerial que otorga la facultad a las Farmacias del Pueblo para la venta de

condones a bajo costo, ofreciendo mayor acceso para toda la población. Se aumentó la inversión de condones por parte del Ministerio de Salud. En estos momentos, el Ministerio de Salud Pública realiza un estudio de línea base y a partir de esta se desarrollará la primera estrategia nacional de PrEP. Durante el año 2017 se alcanzaron 58,221 trabajadoras sexuales; 84,862 hombres que tienen sexo con hombres. A pesar de todos estos logros es importante señalar que solo el 16% de la inversión en la respuesta nacional al VIH fue dedicado a programas de prevención combinada.

COMPROMISO 4. Eliminar las desigualdades de género y acabar con todas las formas de violencia y discriminación contra las mujeres y las niñas, las personas que viven con el VIH y los grupos de población clave, para el año 2020:

Para cumplir el mandato de la Ley que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030, que, en su Artículo 12 contempla incorporar el enfoque de género en todos los planes, programas, proyectos y políticas públicas como una política transversal, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPYD) y el Ministerio de la Mujer están impulsando conjuntamente un proceso de transversalidad del enfoque de género. El mismo persigue la aplicación de los requisitos mínimos establecidos en el Decreto 134-14 que reglamenta la END: a) Disponer de metodologías que sirvan de guía a las instituciones públicas en este proceso; b) Contar con un diagnóstico que determine prioridades, indicadores y metas; c) Definir el ámbito de aplicación de la política transversal de género; y d) Definir el instrumento a utilizar para que la misma sea operativa; e) Identificar la población objetivo atendida; f) Incorporar la política transversal de género en todas las fases del ciclo de las políticas públicas; g) Ejecutar programas sistemáticos de capacitación; h) Sensibilizar a la población, incluyendo lo atinente al currículo educativo; i) Identificar una instancia técnica que sea el enlace con el Ministerio de la Mujer y responsable de dar seguimiento a la implementación de la citada política transversal; j) Definir los bienes y servicios que la institución produce y las asignaciones presupuestarias que contribuyan a lograr los objetivos de esta política transversal específica. A estos fines, se está trabajando con 8 instituciones públicas en una experiencia piloto. El País, a través del liderazgo del Consejo Nacional para el VIH y el SIDA (CONAVIHISDA) ha desarrollado junto con la sociedad civil y agencias internacionales, el Anteproyecto de Ley de Igualdad y No Discriminación que incluye por vez primera artículos sobre Orientación Sexual e Identidad de Género. Además la reforma al Código Penal que se está revisando en éstos momentos se establecen penas en contra de la discriminación, homicidio y tortura en razón de la preferencia y orientación sexual de la víctima. Éstas iniciativas legales pendientes prometen el cambio, si son promulgadas y aplicadas plenamente. Las y los activistas de la sociedad civil han estado trabajando durante décadas para promover los derechos humanos de las personas LGBTI en República Dominicana. Proporcionan servicios legales, de salud, y otros servicios directos a dominicanos y dominicanas LGBTI. Activistas y organizaciones locales también llevan a cabo acciones de incidencia a nivel nacional e internacional reclamando mayores protecciones legales a favor de las personas LGBTI y justicia por las violaciones de Derechos Humanos. Muchos otros utilizan los medios de comunicación y llevan a cabo campañas para contrarrestar la homofobia y transfobia en la sociedad y la estigmatización de las personas LGBT.

COMPROMISO 5. Garantizar que el 90% de los jóvenes tengan los conocimientos y capacidades necesarios para protegerse del VIH y que tengan acceso a servicios de salud sexual y reproductiva para el año 2020, para reducir el número de nuevas infecciones por el VIH entre niñas adolescentes y mujeres jóvenes a menos de 100.000 al año:

Los avances en la mejora del acceso a los servicios de salud son los siguientes: Se promovieron acciones de prevención combinadas, se realizó una amplia campaña dirigida al público en general. Los servicios de SSR y VIH se fortalecieron con el apoyo de diferentes agencias: ahora se dispone de un documento sobre la Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, una estrategia para promover los anticonceptivos; Un Plan Estratégico de la Comisión para la Disponibilidad y Seguridad de los Anticonceptivos y una guía sobre la violencia obstétrica. Se instalaron dispensadores de preservativos y se capacitó a los recursos humanos de salud en el cuidado de la obstetricia respetuosa. Se está implementando una campaña nacional de prevención del embarazo en adolescentes, "Tu No Ta Pa Eso" que asegure la inclusión del VIH

COMPROMISO 6. Garantizar que el 75% de las personas que viven con el VIH o que estén en situación de riesgo o que se vean afectadas por el VIH se beneficien de protección social sensible ante el VIH para el año 2020:

Desde la Respuesta Nacional se han creado mecanismos de coordinación para asegurar la inclusión de las PVVIH en los diversos programas del Gobierno Dominicano que cuentan con intervenciones que permiten a las personas VIH+ acceder a diferentes servicios de corte social: Seguro Nacional de Salud, Programa Solidaridad, Plan Social de la Presidencia y del Despacho de la Primera Dama, Instituto de Formación Técnico Profesional y Programa de Apoyo a la Microempresa (Promypime). Más de 20 mil afiliados al Régimen Subsidiado de SeNaSa y que viven con la condición de VIH tienen garantizado el acceso a los servicios de salud que requieren, de acuerdo a lo establecido en el Plan de Servicios de Salud (PDSS) 3.0, aprobado por el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS). Los servicios están establecidos en el PDSS como apoyo diagnóstico, laboratorio, hospitalizaciones, hemoterapia, cirugías, rehabilitación, entre otros. Los afiliados al régimen subsidiado reciben los tratamientos de su esquema terapéutico a través de los centros de atención integral a nivel nacional. La afiliación de personas que viven con VIH -SIDA se contempla en una resolución del CNSS, en la cual designa a SeNaSa para la afiliación en el Régimen Subsidiado, tras el envío de una matriz que levanta el CONAVIHISDA. Dicha matriz contiene los datos de los potenciales afiliados, los cuales son validados por otras instancias del sistema. De acuerdo al funcionario, las personas que vienen con esta condición de salud pueden solicitar su afiliación tanto en las oficinas de SeNaSa como de CONAVIHISDA, tan solo presentando una copia de su cédula de identidad. Los titulares registrados tienen la oportunidad de afiliarse a su núcleo de dependientes. En cuanto al Programa Solidaridad, Plan Social de la Presidencia, para el 2017, 970 hogares están siendo beneficiarios de la transferencia de dinero condicionada a su chequeo de salud.

COMPROMISO 7. Garantizar que como mínimo el 30% de todas las actuaciones de prestación de servicios estén dirigidas por la comunidad para el año 2020: El Modelo de Atención asumido por el MSP define como puerta de entrada el 1º nivel de atención. Impulsa el abordaje comunitario e integral de las familias con enfoque preventivo, que se traduce en reto para concluir la reorganización de los servicios ITS y VIH. La estrategia de atención primaria se apoya en la participación social comunitaria. Esto implica fortalecer la prevención en las unidades de atención primaria (UNAPS). El reto se centra en desarrollar el Plan de Reorganización de la atención para el VIH/SIDA, para dar respuesta a la demanda inducida en el primer nivel de atención, a parte del trabajo con el personal de salud y promotores comunitarios sobre la discrecional, el estigma y la discriminación.

COMPROMISO 8. Garantizar que las inversiones en materia del VIH se incrementen a 26.000 millones de USD para 2020, con una cuarta parte de esa cifra para prevención del VIH y el 6% para facilitadores sociales: La Respuesta Nacional a las ITS-VIH/SIDA, en la República Dominicana está trabajando de manera coordinada con las instancias para el fortalecimiento institucional, la eficacia y los mecanismos transparentes tal como lo plantea el PEN 2015-2018. Los recursos locales para la adquisición de ARV y suministros en 2017 se incrementaron en un 54,45% (en comparación con 2015 y 2016). Un caso de inversión está disponible y permite a las autoridades locales elegir el mejor escenario financiero para la respuesta al VIH. Con el apoyo técnico de diferentes agencias el país ha llevado a cabo Estudios y se han fortalecido los sistemas de información y se dispone de nuevas tecnologías para el acceso a información de calidad sobre los temas de educación sexual en las escuelas.

COMPROMISO 9. Empoderar a las personas que viven con el VIH, en situación de riesgo en relación con el virus o que se ven afectadas por el VIH para que conozcan sus derechos y accedan a la justicia y a servicios jurídicos para prevenir y dar respuesta a violaciones de derechos humanos: En adición a los datos contemplados en el documento adjunto, podemos destacar lo siguiente: La Unidad de Derechos Humanos, es la representante de la Procuraduría General de la República ante el Grupo Nacional Para la Erradicación de Toda Clase de Estigma y Discriminación (GRUNNED) y, conjuntamente con el CONAVHSIDA, están trabajando en el Anteproyecto de Ley General de Igualdad y No Discriminación, el cual forma parte de las Metas Presidenciales. Que pretende ser un instrumento para enfrentar de manera decidida el estigma y la discriminación y lograr el trato igualitario en los distintos ámbitos de la sociedad, de los grupos vulnerables. El CONAVHSIDA de manera conjunta con el MESCyT, ejecutará el Proyecto Universidad Saludable, programa de Educación Preventiva y Realización de Pruebas Voluntarias de VIH en la Comunidad Universitaria. Se llevará a cabo una evaluación permanente de las actividades desarrolladas y del impacto de las mismas, a través de visitas a las instituciones a los fines de dar seguimiento a las actividades de implementación de la estrategia. En colaboración con el Ministerio de Educación, se impartirán charlas en centros educativos públicos y privados para fomentar una cultura de paz de en las escuelas, con miras a concientizar a niños y adolescente sobre la discriminación y fomentar la inclusión de los grupos vulnerabilizados entre ellos (los jóvenes que viven con VIH/Sida), de esta manera prevenir actos y acciones discriminatorias. Para el año 2017, la Unidad de Derecho Humanos estima presentar el protocolo de atención para personas que viven con VIH y/o Sida para fiscales y demás servidores del Ministerio Público, a los fines de instruirlos de cómo debe ser la asistencia brindada en los casos de personas con esta condición y que sean parte un proceso penal. Junto al protocolo de atención, a través de la Escuela Nacional del Ministerio Público se impartirán talleres a los servidores públicos para sensibilizarlos en materia de Derechos Humanos y de accesibilidad a la justicia. La unidad de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, en cumplimiento de sus funciones, realiza visitas periódicas a los centros de reclusión y detención, mediante la conformación de una comisión, a los fines de dar seguimiento y examinar las condiciones de los internos, de manera de poder garantizar las condiciones mínimas de derechos humanos. Entre los casos trabajados durante las visitas, se encuentra el tema de los internos que viven con VIH, de los cuales el personal de la comisión de encarga de que se les brinde el tratamiento antirretrovirales de manera periódica y toda la asistencia requerida para una persona con esta condición.

COMPROMISO 10. Compromiso para sacar el Sida del aislamiento a través de sistemas centrados en las personas para mejorar la cobertura sanitaria universal, lo que incluye el tratamiento de la tuberculosis, el cáncer de cuello de útero y la hepatitis B y C: Desde las políticas del MSP se ha priorizado la vigilancia y abordaje para la tuberculosis, la hepatitis B y C y el cancer de cuello uterino, con el propósito de mejorar la cobertura. La tuberculosis (TB) es la principal infección oportunista: un 20% de personas con VIH adiccionan una coinfección por TB, y es la primera causa de muerte en personas que viven con VIH. Para prevenir la progresión de la TB latente así como las recurrencias en las personas seropositivas para VIH, se ha establecido el empleo de Terapia Preventiva con Isoniacida (TPI), en las PVIH.

90-90-90 Pruebas y tratamiento del VIH (indicadores 1.1,1.2 y 1.4)

Instrucciones: Todos los países deben completar la Parte 1 y 2. Se recomienda encarecidamente a los países que utilizan Spectrum que importen sus datos de denominador (es decir, estimaciones de las personas que viven con el VIH) e indicador 1.2 de numerador en la segunda parte. Si se dispone de datos detallados desagregados por edad/sexo o de datos específicos subnacionales/de ciudad, deben completarse las Partes 3 y 4.

Por favor vea la guía del GAM y las FAQs para más detalles.

Parte 1. Metadatos de indicadores

1.1 Personas que viven con el VIH y conocen su estado serológico respecto al VIH

¿Se dispone de datos para el período de referencia?: Sí

Fecha final del período de referencia: 2017-12-31

Fuente de datos: Otros (sírvese describir la fuente en el recuadro titulado "Otra información de la fuente")

Otras fuentes de información: Formulario de Aplicación a Políticas Públicas Sociales (FAPPS)/Sistema Único de Registro de los Servicios de Atención Integral (SURSAI)

Información adicional sobre los valores reportados (por ejemplo, referencia a la fuente de datos primarios para las encuestas, preocupaciones metodológicas, datos que no encajan en las celdas): Información a nivel nacional de los establecimientos de salud que cuentan con unidades de servicios de atención integral a VIH, esto incluye Servicios Públicos y ONG. Para este indicador se está utilizando las personas que viven con VIH y están vinculadas al Servicio de Atención Integral.

En el caso de los países que informan tener conocimiento de la situación utilizando datos de vigilancia de casos, ¿en qué año comenzó la notificación nacional de casos?:

1.2 Personas que viven con el VIH que reciben terapia antirretroviral

¿Se dispone de datos para el período de referencia?: Sí

Fecha final del período de referencia: 2017-12-31

Fuente de datos: Otros (sírvese describir la fuente en el recuadro titulado "Otra información de la fuente")

Otras fuentes de información: Políticas Públicas Sociales (FAPPS)/Sistema Único de Registro de los Servicios de Atención Integral (SURSAI)

¿Cuándo se realizó la revisión de calidad de los datos más reciente para determinar la exactitud del número de personas reportadas en tratamiento a nivel nacional?: Finalizado en el último año y resultados disponibles.

Información adicional sobre los valores reportados (por ejemplo, referencia a la fuente de datos primarios para las encuestas, preocupaciones metodológicas, datos que no encajan en las celdas, explicaciones para los ajustes o la estimación de los resultados basados en revisiones de calidad o triangulación con otras fuentes de datos):

1.4 Personas que viven con el VIH y tienen una carga viral suprimida

¿Se dispone de datos para el período de referencia?: Sí

Fecha de inicio del período de notificación: 2017-01-01

Fecha final del período de referencia: 2017-12-31

Fuente de datos: Otros (sírvese describir la fuente en el recuadro titulado "Otra información de la fuente")

Otras fuentes de información: Políticas Publicas Sociales (FAPPS)/Sistema Unico de Registro de los Servicios de Atencion Integral (SURSAI)

¿Cuándo se realizó la revisión de calidad de los datos más reciente para determinar la exactitud del número de personas que reciben una prueba de carga viral a nivel nacional?: Finalizado en el último año y resultados disponibles.

Situación de las pruebas de carga viral entre las personas que reciben tratamiento antirretroviral en el país:
Totalmente accesible para todas las personas en tratamiento (típicamente cobertura >90%)

Información adicional sobre los valores reportados (por ejemplo, referencia a la fuente de datos primarios para las encuestas, preocupaciones metodológicas, datos que no encajan en las celdas, explicaciones para los ajustes a los datos basados en la triangulación con otras fuentes o justificación para usar datos de supresión de carga viral al probar la cobertura de <50%):

1.1,1.2 y 1.4 (denominador: estimaciones de las personas que viven con el VIH)

¿Se dispone de datos para el período de referencia?: Sí

Fecha final del período de referencia: 2017-12-31

Fuente de datos: Spectrum

Otras fuentes de información:

Información adicional sobre los valores reportados (por ejemplo, referencia a la fuente de datos primarios para las encuestas, preocupaciones metodológicas, datos que no encajan en las celdas):

Parte 2. Total y desagregado por edad/sexo

Importar datos de denominador e indicador 1.2 numerador (nacional) de Spectrum: Sí

	Todos	Niños (<15)	Hombres (15+)	Mujeres (15+)
Denominador (nacional) : Estimación de las personas que viven con el VIH	67190	1351	32867	32972
Límite inferior				
Límite superior				

	Todos	Niños (<15)	Hombres (15+)	Mujeres (15+)
Indicador 1.1 Numerador (nacional; A-B para la vigilancia de casos) : Personas que viven con el VIH y conocen su estado serológico respecto al VIH	51623	1084	23067	27472
Indicador 1.2 Numerador (nacional) : Personas en tratamiento antirretroviral	35007	783	15830	18394
Indicador 1.4 Numerador (nacional) : Personas con tratamiento antirretroviral que han suprimido la carga viral	22167	260	6643	11164
Indicador 1.4 Subnumerador : Las personas que son viralmente suprimidas entre los examinados	18067	260	6643	11164
Indicador 1.4 Subdenominador : Personas que reciben una prueba rutinaria de carga viral entre las que reciben tratamiento antirretroviral	28532			

Cálculo de las pruebas de detección y tratamiento del VIH en cascada y porcentajes de 90-90-90

	Todos	Niños (<15)	Hombres (15+)	Mujeres (15+)
Porcentaje (%) : Personas que viven con el VIH que conocen su estado serológico respecto al VIH (primeros 90 años)	77	80	70	83
Porcentaje (%) : Personas que viven con el VIH y están en tratamiento (objetivo: 81%)	52	58	48	56
Porcentaje (%) : Personas que viven con el VIH y tienen una carga viral suprimida (objetivo: 73%)*.	33	19	20	34
Porcentaje (%) : Personas que están en tratamiento entre las que conocen su estado serológico con respecto al VIH (Segundo 90)	68	72	69	67
Porcentaje (%) : Personas en tratamiento antirretroviral que tienen una carga viral suprimida (tercer año 90)*.	63	33	42	61
Cobertura de carga viral (%) : Personas en tratamiento antirretroviral que han tenido una prueba de carga viral Nota: Para los países con una cobertura de prueba de <50%, no introduzca datos para el indicador 1.4 a menos que los datos se consideren representativos a nivel nacional. Los países con una cobertura de pruebas del 50% o superior deben revisar la guía GAM y ajustar la cobertura parcial.	82			

* Calculada sólo para aquellos que informan datos representativos de las pruebas de supresión de la carga viral a nivel nacional.

	Todos	Niños (<15)	Hombres (15+)	Mujeres (15+)
A : Sólo vigilancia de casos: Número acumulativo diagnosticado desde el inicio del sistema	55389			
B : Sólo vigilancia de casos: Muertes acumuladas entre los diagnosticados en el sistema	3766			
Personas que acaban de iniciar el tratamiento antirretroviral	5715	57	2653	3005

Parte 3. Desagregación por grupos de edad/sexo detallados

Nota: Complete cada fila cuando se disponga de datos desagregados por edad y sexo. Si no se recogen datos detallados sobre la edad y el sexo para un indicador específico de grupos de edad específicos, deje estas celdas en blanco. Consulte la guía del GAM y las FAQ para más detalles.

	Niños (< 5)	5-9	10-14	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Hombres (25-49)	Hombres (50+)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)	Mujeres (25-49)	Mujeres (50+)
Denominador (nacional) : Estimación de las personas que viven con el VIH											
Indicador 1.2 Numerador : Personas en tratamiento antirretrovira	157	236	390	318	884	10420	3620	443	1081	12373	5085

Nota: Complete cada fila cuando se disponga de datos desagregados por edad y sexo. Si no se recogen datos detallados sobre la edad y el sexo para un indicador específico de grupos de edad específicos, deje estas celdas en blanco. Consulte la guía del GAM y las FAQ para más detalles.

	Niños (< 5)	5-9	10-14	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Hombres (25-49)	Hombres (50+)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)	Mujeres (25-49)	Mujeres (50+)
Indicador 1.1 Numerador : Personas que viven con el VIH y conocen su estado serológico respecto al VIH	237	386	461	428	1104	14643	6251	575	1792	19287	6459
Personas que acaban de iniciar el tratamiento antirretrovira	27	10	20	96	796	1578	183	102	848	1780	275
Indicador 1.4 Numerador (nacional) : Personas en tratamiento antirretrovira que tienen una carga viral suprimida	82	63	115	88	264	4707	1584	185	376	7748	2855
Indicador 1.4 Subnumerador : Las personas que son viralmente suprimidas entre los examinados	82	63	115	88	264	4707	1584	185	376	7748	2855
Indicador 1.4 Subdenominador : Personas que reciben una prueba rutinaria de carga viral entre las que reciben tratamiento antirretrovira	90	73	141	285	806	8330	3195	397	835	10353	4027

Parte 4a. Zonas subnacionales, todas las edades [Añadir tantas filas como sea necesario]

Nota: Si no se recogen datos subnacionales para un indicador específico, deje esa celda en blanco. Consulte la guía del GAM y las FAQ para más detalles.

Área subnacional	Denominador - Estimativa de las personas que viven con el VIH	Indicador 1.1 Numerador - Personas que viven con el VIH y conocen su estado serológico respecto al VIH	Indicador 1.2 Numerador - Personas en tratamiento antirretroviral	Indicador 1.4 Numerador - Personas en tratamiento antirretroviral que tienen una carga viral suprimida	Indicador 1.4 subnumerador - Personas que son suprimidas víricamente entre las personas sometidas a prueba.	Indicador 1.4 sub-denominador - Personas que reciben una prueba rutinaria de carga viral entre las que reciben tratamiento antirretroviral.
------------------	---	--	---	--	---	---

Alternativamente, puede [descargar éste formato](#), completar las columnas y adjuntarlo utilizando el botón "Agregar archivo"

Parte 4b. Ciudad específica, todas las edades[Añadir tantas filas como sea necesario]

Nota: Si no se recogen datos específicos de la ciudad para un indicador específico, deje esa celda en blanco. Consulte la guía del GAM y las FAQ para más detalles.

Ciudad	Denominador - Estimativa de las personas que viven con el VIH	Indicador 1.1 Numerador - Personas que viven con el VIH y conocen su estado serológico respecto al VIH	Indicador 1.2 Numerador - Personas en tratamiento antirretroviral	Indicador 1.4 Numerador - Personas en tratamiento antirretroviral que tienen una carga viral suprimida	Indicador 1.4 subnumerador - Personas que son suprimidas víricamente entre las personas sometidas a prueba.	Indicador 1.4 sub-denominador - Personas que reciben una prueba rutinaria de carga viral entre las que reciben tratamiento antirretroviral.
Santo Domingo		21589	15644	8074	8074	

1.3 Retención en la terapia antirretroviral a los 12 meses

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Registros de pacientes que reciben terapia antirretrovírica

Otra herramienta/fuente de medición:: Sistema Unico de Registro de los Servicios de Atención Integral (SURSAI)

Desde la fecha: 01/01/2017

Hasta la fecha: 31/12/2017

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

	Total	Niños (<15)	Hombres (15+)	Mujeres (15+)	Estado de lactancia al iniciar la terapia
Porcentaje (%) : Porcentaje de adultos y niños que viven con el VIH de los que se conoce que siguen recibiendo la terapia antirretroviral 12 meses después de su inicio	87.9	69.5	84.5	91.3	0
Numerador : Número de adultos y de niños que siguen vivos y que reciben terapia antirretroviral 12 meses después de iniciar el tratamiento en 2016	3953	57	1695	2201	0
Denominador : Número total de adultos y niños que iniciaron su terapia antirretroviral en el año 2016, dentro del periodo sobre el que se informa, con inclusión de las personas que hayan muerto después de iniciar esa terapia, de quienes hayan suspendido su tratamiento y de aquellos sujetos de los que se haya registrado que se ha perdido su seguimiento en el mes 12.	4498	82	2006	2410	0

Información adicional: además de las personas que siguen con vida y en terapia antirretrovírica, facilite también información de otros resultados a los 12 meses de iniciar el tratamiento

	Valor de datos
Seguimiento interrumpido	320
Abandono de la terapia	214
Fallecimiento	11

1.5 Diagnóstico tardío del VIH

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición: Otros (especificar)

Otra herramienta/fuente de medición: Sistema Unico de Registro de los Servicios de Atencion Integral (SURSAI-Ficha)

Desde la fecha: 01/01/2017

Hasta la fecha: 31/12/2017

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:

Personas que viven con el VIH con un recuento inicial de células CD4 <200 células/mm³

	Todos	Niños (<15)	Hombres (15+)	Mujeres (15+)
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas que viven con el VIH con un recuento inicial de células CD4 <200 células/mm ³ durante el periodo del que se informa	19.2	18.7	23.8	15.2
Numerador : Número de personas que viven con el VIH con un recuento inicial de células CD4 <200 células/mm ³ durante el periodo del que se informa	1064	17	599	448
Denominador : Número total de personas que viven con el VIH con un recuento inicial de células CD4 durante el periodo del que se informa	5556	91	2520	2945

Personas que viven con el VIH con un recuento inicial de células CD4 <350 células/mm³

	Todos	Niños (<15)	Hombres (15+)	Mujeres (15+)
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas que viven con el VIH con un recuento inicial de células CD4 <350 células/mm ³ durante el periodo del que se informa	39.2	30.8	46.4	33.2
Numerador : Número de personas que viven con el VIH con un recuento inicial de células CD4 <350 células/mm ³ durante el periodo del que se informa	2177	28	1170	979
Denominador : Número total de personas que viven con el VIH con un recuento inicial de células CD4 durante el periodo del que se informa	5556	91	2520	2945

1.6 Desabastecimiento de medicamentos antirretrovirales

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición: Otros (especificar)

Otra herramienta/fuente de medición: Informe del Sistema Unico de Gestion de Medicamentos e Insumos

Desde la fecha: 01/01/2017

Hasta la fecha: 31/12/2017

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:

	Total	Clínica general	Centro maternoinfantil	Centro para tratamiento de tuberculosis
Porcentaje (%) : Porcentaje de centros de tratamiento que se quedan sin existencias de uno o más medicamentos antirretrovirales durante un periodo definido	0	0	0	
Numerador : Porcentaje de instalaciones sanitarias que dispensan medicamentos antirretrovirales que experimentan agotamientos de existencias de uno o más medicamentos antirretrovirales durante un periodo definido	0	0	0	
Denominador : Número total de instalaciones sanitarias que dispensan medicamentos antirretrovirales durante ese mismo periodo	74	28	46	

1.7 Mortalidad relacionada con el Sida

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:

Tomar los datos del archivo final de Spectrum:

Todas las edades

	Total	Hombres	Mujeres	Sexo desconocido
Tasa : Número total de personas que han muerto por causas relacionadas con el Sida por cada 100.000 personas				
Numerador : Número de personas que murieron por causas relacionadas con el Sida en 2017				
Denominador : Población total independientemente del estado serológico respecto del VIH				

< 5 años

	Total	Hombres	Mujeres	Sexo desconocido
Indice : Número total de personas (de edades <5 años) que han muerto por causas relacionadas con el Replacé por cada 100.000 personas				
Numerador : Número de personas (de edades <5 años) que murieron por causas relacionadas con el Replacé en 2017				
Denominador : Población total (de edades <5 años) independientemente del estado serológico respecto del VIH				

5-14 años

	Total	Hombres	Mujeres	Sexo desconocido
Indice : Número total de personas (de edades 5-14 años) que han muerto por causas relacionadas con el Replacé por cada 100.000 personas				
Numerador : Número de personas (de edades 5-14 años) que murieron por causas relacionadas con el Replacé en 2017				
Denominador : Población total (de edades 5-14 años) independientemente del estado serológico respecto del VIH				

15+ años

	Total	Hombres	Mujeres	Sexo desconocido
Indice : Número total de personas (de edades 15 o más años) que han muerto por causas relacionadas con el Sida por cada 100.000 personas				
Numerador : Número de personas (de edades 15 o más años) que murieron por causas relacionadas con el Sida en 2017				
Denominador : Población total (de edades 15 o más años) independientemente del estado serológico respecto del VIH				

2.1 Diagnóstico temprano en los recién nacidos

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Laboratorios de pruebas para el diagnóstico infantil precoz y estimaciones del espectro

Otra herramienta/fuente de medición:: Base de dato del Program Nacional de Transmision Materno Infantil

Desde la fecha: 01/01/2017

Hasta la fecha: 31/12/2017

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

	Valor de datos
Denominador : Número de mujeres seropositivas embarazadas que dieron a luz en los últimos 12 meses	955

	Valor de datos
Porcentaje (%) : Porcentaje de hijos de madres seropositivas que recibieron una prueba virológica del VIH en sus dos primeros meses de vida	71.1
Numerador : Número de niños que recibieron una prueba del VIH en sus dos primeros meses de vida, durante el periodo de presentación de informes. Los niños que recibieron las pruebas solo deben contarse una vez	679
Resultado de la prueba - Positivo	30
Resultado de la prueba - Negativo	649
Resultado de la prueba - Indeterminado	0
Resultado de la prueba - Rechazado por el laboratorio	0
Resultado de la prueba - Otro	0

Tomar el denominador del archivo final de Spectrum: No

2.2 Transmisión maternoinfantil del VIH

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Espectro

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha: 01/01/2017

Hasta la fecha: 31/12/2017

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tomar los datos del archivo final de Spectrum: Sí

	Valor de datos
Porcentaje (%) : Porcentaje estimado de niños que contraen el VIH mediante transmisión maternoinfantil entre el número de mujeres que viven con el VIH que han dado a luz en los 12 meses anteriores	
Numerador : Número de niños que contraen la infección por el VIH por transmisión maternoinfantil entre los niños nacidos en los 12 meses anteriores de mujeres que viven con el VIH.	
Denominador : Número estimado de niños nacidos de mujeres que viven con el VIH que hayan dado a luz en los 12 meses anteriores	

2.3 Prevención de la transmisión maternoinfantil del VIH

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Numerador obtenido únicamente de los registros de la clínicas de atención prenatal/prevención de la transmisión maternoinfantil

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha: 01/01/2017

Hasta la fecha: 31/12/2017

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tomar los datos del archivo final de Spectrum: No

	Valor de datos
Porcentaje (%) : Porcentaje de mujeres embarazadas que viven con el VIH y que recibieron fármacos antirretrovirales para reducir el riesgo de transmisión maternoinfantil del VIH	84.9
Numerador : Número de mujeres que viven con el VIH que han dado a luz durante los últimos 12 meses y recibió medicamentos para reducir el riesgo de transmisión maternoinfantil del VIH Los informes mundiales que resumen la cobertura de los medicamentos antirretrovirales para prevenir la transmisión maternoinfantil excluirán a las mujeres que recibieron nevirapina en una sola dosis, ya que se considera un régimen subóptimo. Sin embargo, el país debe informar el número de mujeres que sólo recibieron nevirapina en dosis única.	811
1. Iniciaron de la terapia antirretrovírica durante el embarazo	
2. Ya seguían la terapia antirretrovírica antes del embarazo actual	
6. Otras (comente: por ejemplo, régimen específico, sin categorizar, etc.) En el cuadro de Comentario, para las mujeres que reciban "Otro" régimen, describa el régimen antirretroviral y el número de mujeres que recibe cada categoría de dichos regímenes.	
Si no existen datos desglosados para 1 y 2, facilite el número total de mujeres embarazadas que reciben terapias antirretrovirales para toda la vida	
Denominador : Número estimado de mujeres embarazadas con VIH que dieron a luz en los últimos 12 meses	955

	Valor de datos
3. Profilaxis antirretrovírica triple para la madre (componente profiláctico de Opción B de la OMS)	811
4. AZT para la madre (componente profiláctico durante el embarazo y el parto de la Opción A de la OMS)	
5. Monodosis de Nevirapina únicamente (con o sin cola) Nótese que el valor final publicado para la cobertura de la prevención maternoinfantil no incluye monodosis de nevirapina. Sin embargo, estos datos se recopilan en la herramienta de presentación de informes durante el periodo de retirada progresiva.	

Para las mujeres que reciban "Otro" régimen, describa el régimen antirretroviral y el número de mujeres que recibe cada categoría de dichos regímenes:

Datos sub-nacionales

Introduzca el desglose según región subnacional a continuación [Añada todas las que sean necesarias]

Región sub-nacional	Porcentaje (%)	Número de mujeres que viven con el VIH que han dado a luz durante los últimos 12 meses y recibió medicamentos para reducir el riesgo de transmisión maternoinfantil del VIH	1. Iniciaron de la terapia antirretrovírica durante el embarazo	2. Ya seguían la terapia antirretrovírica antes del embarazo actual	3. Profilaxis antirretrovírica triple para la madre (componente profiláctico de Opción B de la OMS)	4. AZT para la madre (componente profiláctico durante el embarazo y el parto de la Opción A de la OMS)	5. Monodosis de Nevirapina únicamente (con o sin cola)	6. Otras (comente: por ejemplo, régimen específico, sin categorizar, etc.)	Si no existen datos desglosados para 1 y 2, facilite el número total de mujeres embarazadas que reciben terapias antirretrovirales para toda la vida	Denominador

Alternativamente, puede [descargar éste formato](#), completar las columnas y adjuntarlo utilizando el botón "Agregar archivo"

Datos específicos de ciudades

Aporte información para la ciudad capital así como para una o dos ciudades más que sean clave por su alta relevancia epidemiológica

Ciudad	Porcentaje (%)	Número de mujeres que viven con el VIH que han dado a luz durante los últimos 12 meses y recibió medicamentos para reducir el riesgo de transmisión maternoinfantil del VIH	1. Iniciaron de la terapia antirretrovírica durante el embarazo	2. Ya seguían la terapia antirretrovírica antes del embarazo actual	3. Profilaxis antirretrovírica triple para la madre (componente profiláctico de Opción B de la OMS)	4. AZT para la madre (componente profiláctico durante el embarazo y el parto de la Opción A de la OMS)	5. Monodosis de Nevirapina únicamente (con o sin cola)	6. Otras (comente: por ejemplo, régimen específico, sin categorizar, etc.)	Si no existen datos desglosados para 1 y 2, facilite el número total de mujeres embarazadas que reciben terapias antirretrovirales para toda la vida	Denominador
Santo Domingo	97.57	402			402					412
Santiago	100	70			70					70

2.4 Casos de sífilis entre mujeres embarazadas

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Datos del programa nacional

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha: 01/01/2017

Hasta la fecha: 31/12/2017

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

¿Son los datos representativos de todo el país?: Sí

En caso negativo, sírvase describir la representatividad de los datos:

Tipo de prueba (o pruebas) usada por lo general en su país para definir si una mujer embarazada da positivo: mixtas/desconocidas

A. Casos de sífilis entre mujeres embarazadas

En cualquier consulta de atención prenatal

	Total
Porcentaje (%) : Cobertura de pruebas sobre sífilis en mujeres que recibieron servicios de atención prenatal (en cualquier visita)	42.2
Numerador : Número de mujeres que acudieron a servicios de atención prenatal y se realizaron las pruebas de la sífilis (en cualquier visita)	123526
Denominador : Número de mujeres que acudieron a servicios de atención prenatal	292779

En la primera visita prenatal (<13 semanas de gestación)

	Total
Porcentaje (%) : Cobertura de pruebas de sífilis en mujeres que recurren a servicios de atención prenatal en la primera visita prenatal (<13 semanas de gestación)	
Numerador : Número de mujeres que recurren a servicios de atención prenatal y que se sometieron a la prueba de sífilis durante la primera visita prenatal (<13 semanas de gestación)	
Denominador : Número de mujeres que acudieron a servicios de atención prenatal.	

B. Porcentaje de mujeres embarazadas que acuden a servicios de atención prenatal con una serología de sífilis (reactiva) positiva

	Todos	15-24	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de mujeres embarazadas que acuden a servicios de atención prenatal con una serología de sífilis (reactiva) positiva	1.6		
Numerador : Número de pacientes que acuden a clínicas de atención prenatal con un resultado positivo para la sífilis	1957		
Denominador : Número de pacientes que acuden a clínicas de atención prenatal que se realizaron las pruebas de sífilis	123526		

C. Porcentaje de mujeres que acuden a servicios de atención prenatal durante un determinado periodo con serología de sífilis positiva que recibieron tratamiento adecuado

	Total
Porcentaje (%) : Porcentaje de mujeres que acuden a servicios de atención prenatal durante un determinado periodo con serología de sífilis positiva que recibieron tratamiento adecuado	54.1
Numerador : Número de mujeres que recibieron servicios de atención prenatal que recibieron resultados positivos en las pruebas sobre sífilis que recibieron como mínimo una dosis de penicilina benzatina 2,4 millones de unidades intramuscularmente	1059
Denominador : Número de mujeres que recibieron servicios de atención prenatal que recibieron resultados positivos en las pruebas sobre sífilis	1957

2.5 Índice de sífilis congénita (partos de nacidos vivos y partos de mortinatos)

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

¿Son los datos representativos de todo el país?: No

En caso negativo, indique la representatividad de los datos:

¿Incluye su definición de casos para la sífilis congénita los partos de mortinatos?:

Los países deben comentar si existen grandes diferencias entre la definición nacional de casos y la definición de casos de vigilancia mundial, disponible en la página 15 de:

<http://www.who.int/reproductivehealth/publications/rtis/9789241505895/en/index.html>:

	Total
Porcentaje (%) : Porcentaje de casos de sífilis congénita registrados (nacimientos y mortinatos)	
Numerador : Número de casos de sífilis congénita registrados (nacimientos y mortinatos) en los últimos 12 meses.	
Denominador : Número de nacimientos	

2.6 Pruebas de detección del VIH en mujeres embarazadas

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

	Todas las mujeres embarazadas	Todas las mujeres que se inyectan drogas (opcional)
Porcentaje (%) : Porcentaje de mujeres embarazadas que conocen su estado respecto al VIH		
Numerador : Número de mujeres embarazadas que acuden a un centro de atención prenatal y/o que dan a luz en un centro de salud y se sometieron a las pruebas del VIH durante el embarazo, o bien ya sabían que eran seropositivas antes		
1. Infección por el VIH conocida al registrarse en la clínica prenatal		
2. Los resultados de las pruebas del VIH en el centro de atención prenatal durante el embarazo actual son positivos		
3. Los resultados de las pruebas del VIH en la clínica de atención prenatal durante el embarazo actual son negativos		
Número total de mujeres seropositivas identificadas (1+2)		
Denominador basado en la población : Número de mujeres embarazadas que dieron a luz en los últimos 12 meses		
Denominador basado en el programa : Número de mujeres embarazadas que acudieron a un centro de atención prenatal o dieron a luz en un centro de salud en los últimos 12 meses		

Datos específicos de ciudades

Aporte información para la ciudad capital así como para una o dos ciudades más que sean clave por su alta relevancia epidemiológica

Ciudad	Porcentaje (utilizando un denominador basado en la población)	Numerador	Denominador basado en la población
--------	---	-----------	------------------------------------

3.1 Incidencia del VIH

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Medición indirecta (por ejemplo, Spectrum o AEM)

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha: 01/01/2017

Hasta la fecha: 31/12/2017

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tomar los datos del archivo final de Spectrum: Sí

por sexo y edad

	15-49	50+	15-24	0-14	Todos
Incidencia : Número de nuevas infecciones por el VIH en el periodo de reporte por cada 1000 personas no infectadas					
Numerador : Número de nuevas infecciones durante el periodo de reporte multiplicado por 1000					
Denominador : Número total de personas no infectadas (o persona-años expuesta)					

por sexo y edad

	Hombres (15-49)	Mujeres (15-49)	Hombres (50+)	Mujeres (50+)	Hombres (15-24)	Mujeres (15-24)
Incidencia : Número de nuevas infecciones por el VIH en el periodo de reporte por cada 1000 personas no infectadas						
Numerador : Número de nuevas infecciones durante el periodo de reporte multiplicado por 1000						
Denominador : Número total de personas no infectadas (o persona-años expuesta)						

Datos sub-nacionales

Introduzca el desglose según región subnacional a continuación [Añada todas las que sean necesarias]

Región sub-nacional	Incidencia por cada 1000 personas (adultos 15-49*)	Incidencia por cada 1000 personas (hombres 15-49*)	Incidencia por cada 1000 personas (mujeres 15-49*)	Numerador (adultos 15-49*)	Numerador (hombres 15-49*)	Numerador (mujeres 15-49*)	Denominador (adultos 15-49*)	Denominador (hombres 15-49*)	Denominador (mujeres 15-49*)	*Rango de edad (si no se dispone de datos para 15-49)

Alternativamente, puede [descargar este formato](#), completar las columnas y adjuntarlo utilizando el botón "Agregar archivo"

Datos específicos de ciudades

Aporte información para la ciudad capital así como para una o dos ciudades más que sean clave por su alta relevancia epidemiológica

Ciudad	Incidencia por cada 1000 personas (adultos 15-49*)	Incidencia por cada 1000 personas (hombres 15-49*)	Incidencia por cada 1000 personas (mujeres 15-49*)	Numerador (adultos 15-49*)	Numerador (hombres 15-49*)	Numerador (mujeres 15-49*)	Denominador (adultos 15-49*)	Denominador (hombres 15-49*)	Denominador (mujeres 15-49*)	*Rango de edad (si no se dispone de datos para 15-49)

3.2 Estimaciones sobre el tamaño de grupos de población clave

A. Profesionales del sexo

¿Ha estimado el tamaño del grupo de población de los profesionales del sexo?: Sí

Año de la última estimación: 2004

Estimación del tamaño: 97758

Región para la cual se ha realizado la última estimación (por ejemplo, para todo el país, para una provincia, para la capital, etc.): Nacional

Definición utilizada para la población y criterios de inclusión utilizados en el estudio/encuesta, según corresponda: Trabajadoras sexuales Trabajo sexual: intercambio de sexo por dinero en un periodo de tiempo”, Sexo transaccional: intercambio de sexo por dinero, bienes o favores.

Método utilizado para obtener la estimación del tamaño: La metodología consistió en el desarrollo de dos etapas de investigación: la recolección de información y el análisis de la información disponible. En los casos en que no se identificó documentos con estimaciones de tamaño poblacional se recurrió al método multiplicador.

Comentarios y información adicional: Solo se estimo trabajoras Sexuales (Estimacion de mujeres trabajadoras sexuales KERRIGAN, 2004)

Datos sub-nacionales - Profesionales del sexo

Introduzca el desglose por lugar abajo [añada las que sean necesarias]

Tipo de área	Nombre de área	Año de la última estimación	Estimación del tamaño	Método para derivar la estimación del tamaño
--------------	----------------	-----------------------------	-----------------------	--

B. Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres

¿Ha estimado el tamaño del grupo de población de los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres?: Sí

Año de la última estimación: 2014

Estimación del tamaño: 130572

Región para la cual se ha realizado la última estimación (por ejemplo, para todo el país, para una provincia, para la capital, etc.): Nacional

Definición utilizada para la población y criterios de inclusión utilizados en el estudio/encuesta, según corresponda: Gays y hombres que tienen sexo con hombres: Hombres que reportan haber tenido sexo anal y/o sexo oral con otro hombre en los últimos seis meses y se identifica como gay, u Hombres que tienen sexo con hombres.

Método utilizado para obtener la estimación del tamaño: La metodología consistió en el desarrollo de dos etapas de investigación: la recolección de información y el análisis de la información disponible. En los casos en que no se identificó documentos con estimaciones de tamaño poblacional se recurrió al método multiplicador.

Comentarios y información adicional:

Datos sub-nacionales - Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres

Introduzca el desglose por lugar abajo [añada las que sean necesarias]

Tipo de área	Nombre de área	Año de la última estimación	Estimación del tamaño	Método para derivar la estimación del tamaño
--------------	----------------	-----------------------------	-----------------------	--

C. Usuarios de drogas inyectables

¿Ha estimado el tamaño del grupo de población de las personas que consumen drogas inyectables?: Sí

Año de la última estimación: 2013

Estimación del tamaño: 900

Región para la cual se ha realizado la última estimación (por ejemplo, para todo el país, para una provincia, para la capital, etc.): Santo Domingo y Santiago

Definición utilizada para la población y criterios de inclusión utilizados en el estudio/encuesta, según corresponda: Personas que han usado drogas inyectables en el último año

Método utilizado para obtener la estimación del tamaño: Encuesta

Comentarios y información adicional:

Datos sub-nacionales - Usuarios de drogas inyectables

Introduzca el desglose por lugar abajo [añada las que sean necesarias]

Tipo de área	Nombre de área	Año de la última estimación	Estimación del tamaño	Método para derivar la estimación del tamaño
--------------	----------------	-----------------------------	-----------------------	--

D. Personas transgénero

¿Ha estimado el tamaño del grupo de población de las personas transgénero?: Sí

Año de la última estimación: 2014

Estimación del tamaño: 9327

Región para la cual se ha realizado la última estimación (por ejemplo, para todo el país, para una provincia, para la capital, etc.): Nacional

Definición utilizada para la población y criterios de inclusión utilizados en el estudio/encuesta, según corresponda: Mujeres TRANS Persona que se identifica con un sexo opuesto a su sexo biológico o por persona que se identifica con un sexo distinto con el que nació.

Método utilizado para obtener la estimación del tamaño: La metodología consistió en el desarrollo de dos etapas de investigación: la recolección de información y el análisis de la información disponible. En los casos en que no se identificó documentos con estimaciones de tamaño poblacional se recurrió al método multiplicador.

Comentarios y información adicional:

Datos sub-nacionales - Personas transgénero

Introduzca el desglose por lugar abajo [añada las que sean necesarias]

Tipo de área	Nombre de área	Año de la última estimación	Estimación del tamaño	Método para derivar la estimación del tamaño
--------------	----------------	-----------------------------	-----------------------	--

E. Reclusos/detenidos

¿Ha estimado el tamaño del grupo de población de los presos?: Sí

Año de la última estimación: 2014

Estimación del tamaño: 19994

Región para la cual se ha realizado el último censo (por ejemplo, para todo el país, para una provincia, para la capital, etc.): Nacional

Definición utilizada para la población y criterios de inclusión utilizados en el estudio/encuesta, según corresponda: Personas privadas de libertad: Persona que se encuentran privados/as de libertad, sea por detención temporal (detenido/a) o preso/a, a causa de una ofensa criminal.

Comentarios y información adicional (incluir la fuente y otra información de referencia pertinente):

Datos sub-nacionales - Reclusos/detenidos

Introduzca el desglose por lugar abajo [añada las que sean necesarias]

Tipo de área	Nombre de área	Año de la última estimación	Estimación del tamaño
--------------	----------------	-----------------------------	-----------------------

3.3A Prevalencia del VIH entre profesionales del sexo

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de profesionales del sexo que vive con el VIH						
Numerador : Número de profesionales del sexo cuyo resultado en la prueba del VIH fue positivo						
Denominador : Número de profesionales del sexo que se realizó la prueba del VIH						

Datos sub-nacionales

Total y desglose por edad

Introduzca el desglose por región abajo [añada las que sean necesarias]

Tipo de área	Nombre de área	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Todo - Numerador	Total - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
--------------	----------------	----------------------	----------------	------------------	---------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-------------------

Desglose por sexo

Introduzca el desglose por lugar en el mismo orden de la tabla que se encuentra más abajo [añada las líneas que sean necesarias]

Nombre de área	Hombres - Numerador	Hombres - Denominador	Mujeres - Numerador	Mujeres - Denominador	Hombres (<25) - Numerador	Hombres (<25) - Denominador	Mujeres (<25) - Numerador	Mujeres (<25) - Denominador
----------------	---------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------

3.3B Prevalencia del VIH entre hombres que tienen relaciones sexuales con hombres

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todos	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que vive con el VIH			
Numerador : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres con resultado positivo en la prueba del VIH			
Denominador : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que se realizó la prueba del VIH			

Datos sub-nacionales

Total y desglose por edad

Introduzca el desglose por región abajo [añada las que sean necesarias]

Tipo de área	Nombre de área	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Todo - Numerador	Total - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
--------------	----------------	----------------------	----------------	------------------	---------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-------------------

3.3C Prevalencia del VIH en personas que consumen drogas inyectables

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de usuarios de drogas inyectables que vive con el VIH						
Numerador : Número de usuarios de drogas inyectables que dieron positivo en las pruebas del VIH						
Denominador : Número de usuarios de drogas inyectables que se realizaron las pruebas del VIH						

Datos sub-nacionales

Total y desglose por edad

Introduzca el desglose por región abajo [añada las que sean necesarias]

Tipo de área	Nombre de área	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Todo - Numerador	Total - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
--------------	----------------	----------------------	----------------	------------------	---------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-------------------

Desglose por sexo

Introduzca el desglose por lugar en el mismo orden de la tabla que se encuentra más abajo [añada las líneas que sean necesarias]

Nombre de área	Hombres - Numerador	Hombres - Denominador	Mujeres - Numerador	Mujeres - Denominador	Hombres (<25) - Numerador	Hombres (<25) - Denominador	Mujeres (<25) - Numerador	Mujeres (<25) - Denominador
----------------	---------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------

3.3D Prevalencia del VIH entre las personas transgénero

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todos	hombres transgénero	mujeres transgénero	otro	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas transgénero que viven con el VIH						
Numerador : Número de personas transgénero con resultado positivo en las pruebas del VIH						
Denominador : Número de personas transgénero que se realizaron las pruebas del VIH						

Datos sub-nacionales

Total y desglose por edad

Introduzca el desglose por región abajo [añada las que sean necesarias]

Tipo de área	Nombre de área	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Todo - Numerador	Total - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
--------------	----------------	----------------------	----------------	------------------	---------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-------------------

Desglose por sexo

Introduzca el desglose por lugar en el mismo orden de la tabla que se encuentra más abajo [añada las líneas que sean necesarias]

Nombre de área	Hombres transgénero - Numerador	Hombres transgénero - Denominador	Mujeres transgénero - Numerador	Mujeres transgénero - Denominador	Hombres transgénero (<25) - Numerador	Hombres transgénero (<25) - Denominador	Mujeres transgénero (<25) - Numerador	Mujeres transgénero (<25) - Denominador
----------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	---	---------------------------------------	---

3.3E Prevalencia del VIH entre los presos

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de reclusos/detenidos que viven con el VIH						
Numerador : Número de reclusos/detenidos con resultado positivo en las pruebas del VIH						
Denominador : Número de reclusos/detenidos que se realizaron las pruebas del VIH						

Datos sub-nacionales

Total y desglose por edad

Introduzca el desglose por región abajo [añada las que sean necesarias]

Tipo de área	Nombre de área	Porcentaje (%)	Todo - Numerador	Total - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
--------------	----------------	----------------	------------------	---------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-------------------

Desglose por sexo

Introduzca el desglose por lugar en el mismo orden de la tabla que se encuentra más abajo [añada las líneas que sean necesarias]

Nombre de área	Hombres - Numerador	Hombres - Denominador	Mujeres - Numerador	Mujeres - Denominador	Hombres (<25) - Numerador	Hombres (<25) - Denominador	Mujeres (<25) - Numerador	Mujeres (<25) - Denominador
----------------	---------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------

3.4A Pruebas de VIH entre profesionales del sexo

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de profesionales del sexo que se hicieron la prueba del VIH en los últimos 12 meses, o que conocen su estado actual de VIH						
A : Número de profesionales del sexo que se han sometido a pruebas y cuyo resultado es positivo						
B : Número de profesionales del sexo que se han sometido a pruebas en los últimos 12 meses y cuyo resultado es negativo						
Numerador (A + B) : Número de profesionales del sexo que conocen su estado serológico respecto del VIH						
Denominador : Número de profesionales del sexo que contestaron a la pregunta "¿Conoce usted su estado serológico a través de pruebas para el VIH?"						

Datos sub-nacionales

Introduzca el desglose por región abajo [añada las que sean necesarias]

Tipo de área	Nombre de área	Número de entrevistados en la encuesta	Número de los que contestaron "No, nunca me he sometido a esas pruebas"	Número de los que contestaron "Sí, me he sometido a esas pruebas"	Último test: <12 meses y VIH positivo	Último test: <12 meses y VIH negativo	Última prueba: >12 meses y VIH positivo	Última prueba: >12 meses y VIH negativo	Resultado: Positivo (fecha de la prueba no disponible)	Resultado: Negativo (fecha de la prueba no disponible)	resultado: indeterminado
--------------	----------------	--	---	---	---------------------------------------	---------------------------------------	---	---	--	--	--------------------------

3.4B Pruebas de VIH entre hombres que tienen relaciones sexuales con hombres

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todos	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que se han hecho la prueba del VIH en los últimos 12 meses o saben que viven con el VIH			
A : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que se han sometido a pruebas y cuyo resultado es positivo			
B : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que se han sometido a pruebas en los últimos 12 meses y cuyo resultado es negativo			
Numerador (A + B) : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que conocen su estado serológico respecto del VIH			
Denominador : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que contestaron a la pregunta "¿Conoce usted su estado serológico a través de pruebas para el VIH?"			

Datos sub-nacionales

Introduzca el desglose por región abajo [añada las que sean necesarias]

Tipo de área	Nombre de área	Número de entrevistados en la encuesta	Número de los que contestaron "No, nunca me he sometido a esas pruebas"	Número de los que contestaron "Sí, me he sometido a esas pruebas"	Último test: <12 meses y VIH positivo	Último test: <12 meses y VIH negativo	Última prueba: >12 meses y VIH positivo	Última prueba: >12 meses y VIH negativo	Resultado: Positivo (fecha de la prueba no disponible)	Resultado: Negativo (fecha de la prueba no disponible)	resultado: indeterminado

3.4C Pruebas de VIH entre personas que se inyectan drogas

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas que se inyectan drogas que se sometieron a la prueba del VIH en los últimos 12 meses o que saben que viven con el VIH						
A : Número de personas que consumen drogas inyectables que se han sometido a pruebas y cuyo resultado es positivo						
B : Número de personas que consumen drogas inyectables que se han sometido a pruebas en los últimos 12 meses y cuyo resultado es negativo						
Numerador (A + B) : Número de personas que consumen drogas inyectables y que conocen su estado serológico respecto del VIH						
Denominador : Número de personas que consumen drogas inyectables que contestaron a la pregunta "¿Conoce usted su estado serológico a través de pruebas para el VIH?"						

Datos sub-nacionales

Introduzca el desglose por región abajo [añada las que sean necesarias]

Tipo de área	Nombre de área	Número de entrevistados en la encuesta	Número de los que contestaron "No, nunca me he sometido a esas pruebas"	Número de los que contestaron "Sí, me he sometido a esas pruebas"	Último test: <12 meses y VIH positivo	Último test: <12 meses y VIH negativo	Última prueba: >12 meses y VIH positivo	Última prueba: >12 meses y VIH negativo	Resultado: Positivo (fecha de la prueba no disponible)	Resultado: Negativo (fecha de la prueba no disponible)	resultado: indeterminado
--------------	----------------	--	---	---	---------------------------------------	---------------------------------------	---	---	--	--	--------------------------

3.4D Pruebas de VIH entre personas transgénero

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todos	hombres transgénero	mujeres transgénero	otro	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas transgénero que se han hecho la prueba del VIH en los últimos 12 meses o saben que viven con el VIH						
A : Número de personas transgénero que se han sometido a pruebas y cuyo resultado es positivo						
B : Número de personas transgénero que se han sometido a pruebas en los últimos 12 meses y cuyo resultado es negativo						
Numerador (A + B) : Número de personas transgénero que conocen su estado serológico respecto del VIH						
Denominador : Número de personas transgénero que contestaron a la pregunta "¿Conoce usted su estado serológico a través de pruebas para el VIH?"						

Datos sub-nacionales

Introduzca el desglose por región abajo [añada las que sean necesarias]

Tipo de área	Nombre de área	Número de entrevistados en la encuesta	Número de los que contestaron "No, nunca me he sometido a esas pruebas"	Número de los que contestaron "Sí, me he sometido a esas pruebas"	Último test: <12 meses y VIH positivo	Último test: <12 meses y VIH negativo	Última prueba: >12 meses y VIH positivo	Última prueba: >12 meses y VIH negativo	Resultado: Positivo (fecha de la prueba no disponible)	Resultado: Negativo (fecha de la prueba no disponible)	resultado: indeterminado
--------------	----------------	--	---	---	---------------------------------------	---------------------------------------	---	---	--	--	--------------------------

3.5A Cobertura de terapias antirretrovirales entre profesionales del sexo que viven con el VIH

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de profesionales del sexo que viven con el VIH que han estado recibiendo terapias antirretrovirales en los 12 meses anteriores						
Numerador : Número de encuestados que viven con el VIH que declaran haber estado recibiendo terapias antirretrovirales en los 12 meses anteriores						
Denominador : Número de encuestados que viven con el VIH						

Datos sub-nacionales

Total y desglose por edad

Introduzca el desglose por región abajo [añada las que sean necesarias]

Tipo de área	Nombre de área	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Total - Numerador	Total - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
--------------	----------------	----------------------	----------------	-------------------	---------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-------------------

Desglose por sexo

Introduzca el desglose por lugar en el mismo orden de la tabla que se encuentra más abajo [añada las líneas que sean necesarias]

Nombre de área	Hombres - Numerador	Hombres - Denominador	Mujeres - Numerador	Mujeres - Denominador	Hombres (<25) - Numerador	Hombres (<25) - Denominador	Mujeres (<25) - Numerador	Mujeres (<25) - Denominador
----------------	---------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------

3.5B Cobertura de terapias antirretrovirales entre los hombres que tienen relaciones con hombres y que viven con el VIH

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todos	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que viven con el VIH y que han estado recibiendo terapias antirretrovirales en los 12 meses anteriores			
Numerador : Número de encuestados que viven con el VIH que declaran haber estado recibiendo terapias antirretrovirales en los 12 meses anteriores			
Denominador : Número de encuestados que viven con el VIH			

Datos sub-nacionales

Total y desglose por edad

Introduzca el desglose por región abajo [añada las que sean necesarias]

Tipo de área	Nombre de área	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Total - Numerador	Total - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
--------------	----------------	----------------------	----------------	-------------------	---------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-------------------

3.5C Cobertura de terapias antirretrovirales entre personas que consumen drogas inyectables y que viven con el VIH

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas que consumen drogas inyectables que viven con el VIH y que han estado recibiendo terapias antirretrovirales en los 12 meses anteriores						
Numerador : Número de encuestados que viven con el VIH que declaran haber estado recibiendo terapias antirretrovirales en los 12 meses anteriores						
Denominador : Número de encuestados que viven con el VIH						

Datos sub-nacionales

Total y desglose por edad

Introduzca el desglose por región abajo [añada las que sean necesarias]

Tipo de área	Nombre de área	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Total - Numerador	Total - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
--------------	----------------	----------------------	----------------	-------------------	---------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-------------------

Desglose por sexo

Introduzca el desglose por lugar en el mismo orden de la tabla que se encuentra más abajo [añada las líneas que sean necesarias]

Nombre de área	Hombres - Numerador	Hombres - Denominador	Mujeres - Numerador	Mujeres - Denominador	Hombres (<25) - Numerador	Hombres (<25) - Denominador	Mujeres (<25) - Numerador	Mujeres (<25) - Denominador
----------------	---------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------

3.5D Cobertura de terapias antirretrovirales entre las personas transgénero que viven con el VIH

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todos	hombres transgénero	mujeres transgénero	otro	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas transgénero que viven con el VIH que han estado recibiendo terapias antirretrovirales en los 12 meses anteriores						
Numerador : Número de encuestados que viven con el VIH que declaran haber estado recibiendo terapias antirretrovirales en los 12 meses anteriores						
Denominador : Número de encuestados que viven con el VIH						

Datos sub-nacionales

Total y desglose por edad

Introduzca el desglose por región abajo [añada las que sean necesarias]

Tipo de área	Nombre de área	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Total - Numerador	Total - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
--------------	----------------	----------------------	----------------	-------------------	---------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-------------------

Desglose por sexo

Introduzca el desglose por lugar en el mismo orden de la tabla que se encuentra más abajo [añada las líneas que sean necesarias]

Nombre de área	Hombres transgénero - Numerador	Hombres transgénero - Denominador	Mujeres transgénero - Numerador	Mujeres transgénero - Denominador	Hombres transgénero (<25) - Numerador	Hombres transgénero (<25) - Denominador	Mujeres transgénero (<25) - Numerador	Mujeres transgénero (<25) - Denominador
----------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	---	---------------------------------------	---

3.5E Cobertura de terapias antirretrovirales entre los presos que viven con el VIH

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de presos que viven con el VIH que han estado recibiendo terapias antirretrovirales en los 12 meses anteriores						
Numerador : Número de encuestados que viven con el VIH que declaran haber estado recibiendo terapias antirretrovirales en los 12 meses anteriores						
Denominador : Número de encuestados que viven con el VIH						

Datos sub-nacionales

Total y desglose por edad

Introduzca el desglose por región abajo [añada las que sean necesarias]

Tipo de área	Nombre de área	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Total - Numerador	Total - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
--------------	----------------	----------------------	----------------	-------------------	---------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-------------------

Desglose por sexo

Introduzca el desglose por lugar en el mismo orden de la tabla que se encuentra más abajo [añada las líneas que sean necesarias]

Nombre de área	Hombres - Numerador	Hombres - Denominador	Mujeres - Numerador	Mujeres - Denominador	Hombres (<25) - Numerador	Hombres (<25) - Denominador	Mujeres (<25) - Numerador	Mujeres (<25) - Denominador
----------------	---------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------

3.6A Uso del preservativo entre los profesionales del sexo

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de profesionales del sexo que declara haber utilizado un preservativo con su último cliente						
Numerador : Número de profesionales del sexo que declaró haber usado un preservativo con su último cliente						
Denominador : Número de profesionales del sexo que declaró haber mantenido relaciones sexuales a cambio de dinero en los últimos 12 meses						

Datos sub-nacionales

Total y desglose por edad

Introduzca el desglose por región abajo [añada las que sean necesarias]

Tipo de área	Nombre de área	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Total - Numerador	Total - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
--------------	----------------	----------------------	----------------	-------------------	---------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-------------------

Desglose por sexo

Introduzca el desglose por lugar en el mismo orden de la tabla que se encuentra más abajo [añada las líneas que sean necesarias]

Nombre de área	Hombres - Numerador	Hombres - Denominador	Mujeres - Numerador	Mujeres - Denominador	Hombres (<25) - Numerador	Hombres (<25) - Denominador	Mujeres (<25) - Numerador	Mujeres (<25) - Denominador
----------------	---------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------

3.6B Uso del preservativo entre hombres que tienen relaciones sexuales con hombres

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todos	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de hombres que declara haber utilizado un preservativo durante su último coito anal con una pareja masculina			
Numerador : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que declara haber usado un preservativo durante el último coito anal con una pareja masculina			
Denominador : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que declaró haber mantenido un coito anal con una pareja masculina en los últimos seis meses			

Datos sub-nacionales

Total y desglose por edad

Introduzca el desglose por región abajo [añada las que sean necesarias]

Tipo de área	Nombre de área	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Total - Numerador	Total - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
--------------	----------------	----------------------	----------------	-------------------	---------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-------------------

3.6C Uso del preservativo entre las personas que consumen drogas inyectables

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de usuarios de drogas inyectables que afirma haber utilizado preservativo en su última relación sexual						
Numerador : Número de usuarios de drogas inyectables que afirmaron haber utilizado preservativo en su última relación sexual						
Denominador : Número de usuarios de drogas inyectables que afirman haberse inyectado drogas y mantenido relaciones sexuales en el último mes						

Datos sub-nacionales

Total y desglose por edad

Introduzca el desglose por región abajo [añada las que sean necesarias]

Tipo de área	Nombre de área	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Total - Numerador	Total - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
--------------	----------------	----------------------	----------------	-------------------	---------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-------------------

Desglose por sexo

Introduzca el desglose por lugar en el mismo orden de la tabla que se encuentra más abajo [añada las líneas que sean necesarias]

Nombre de área	Hombres - Numerador	Hombres - Denominador	Mujeres - Numerador	Mujeres - Denominador	Hombres (<25) - Numerador	Hombres (<25) - Denominador	Mujeres (<25) - Numerador	Mujeres (<25) - Denominador
----------------	---------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------

3.6D Uso del preservativo entre las personas transgénero

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todos	hombres transgénero	mujeres transgénero	otro	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas transgénero que reportan haber utilizado el preservativo durante su última relación sexual o última ocasión en que practicaron sexo anal						
Numerador : Número de personas transgénero que reportan haber utilizado el preservativo durante su última relación sexual o última ocasión en que practicaron sexo anal						
Denominador : Número de personas transgénero encuestadas						

Datos sub-nacionales

Total y desglose por edad

Introduzca el desglose por región abajo [añada las que sean necesarias]

Tipo de área	Nombre de área	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Total - Numerador	Total - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
--------------	----------------	----------------------	----------------	-------------------	---------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-------------------

Desglose por sexo

Introduzca el desglose por lugar en el mismo orden de la tabla que se encuentra más abajo [añada las líneas que sean necesarias]

Nombre de área	Hombres transgénero - Numerador	Hombres transgénero - Denominador	Mujeres transgénero - Numerador	Mujeres transgénero - Denominador	Hombres transgénero (<25) - Numerador	Hombres transgénero (<25) - Denominador	Mujeres transgénero (<25) - Numerador	Mujeres transgénero (<25) - Denominador
----------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	---	---------------------------------------	---

3.7A Cobertura de los programas de prevención del VIH entre profesionales del sexo

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Otros (especifique la estrategia y el lugar del muestreo)

Otra herramienta/fuente de medición:: Sistema de Registro de Poblaciones Clave.

Desde la fecha: 01/01/2017

Hasta la fecha: 31/12/2017

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: Centros donde intervienen a Trabajadoras Sexuales de forma particular: 1. COIN (Santo Domingo, Santiago) 2. ADOPLAFAM 3. MODEMU 4. CEPROSH (Puerto Plata y Dajabon) 5. FUMUDESJU

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

I. Vigilancia del comportamiento u otras encuestas especiales

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta: 97758

Tabla A. En los últimos tres meses, ¿se le han facilitado a usted preservativos y lubricante? (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de salud sexual)

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de profesionales del sexo que contestaron afirmativamente a la pregunta "En los últimos tres meses, ¿se le han facilitado a usted preservativos y lubricante? (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de salud sexual)"						
Numerador : Número de profesionales del sexo que contestaron afirmativamente						
Denominador : Número de profesionales del sexo que contestaron						

Tabla B. En los tres últimos meses, ¿ha recibido usted asesoramiento sobre el uso del preservativo y prácticas sexuales seguras? (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de salud sexual)

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de profesionales del sexo que contestaron afirmativamente a la pregunta "En los tres últimos meses, ¿ha recibido usted asesoramiento sobre el uso del preservativo y prácticas sexuales seguras? (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de salud sexual)"						
Numerador : Número de profesionales del sexo que contestaron afirmativamente						
Denominador : Número de profesionales del sexo que contestaron						

Tabla C. ¿Se ha sometido usted en los últimos tres meses a pruebas para la detección de infecciones de transmisión sexual?

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de profesionales del sexo que contestaron afirmativamente a la pregunta ¿Se ha sometido usted en los últimos tres meses a pruebas para la detección de infecciones de transmisión sexual? "						
Numerador : Número de profesionales del sexo que contestaron afirmativamente						
Denominador : Número de profesionales del sexo que contestaron						

Tabla D. Porcentaje de profesionales del sexo que dan cuenta de haber recibido como mínimo dos de los servicios de prevención del VIH mencionados anteriormente a través de ONG, proveedores sanitarios u otras fuentes

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de encuestados que reportan haber recibido como mínimo dos de los siguientes servicios de prevención del VIH a través de ONG, proveedores sanitarios u otras fuentes						
Numerador : Número de profesionales del sexo que reportan haber recibido como mínimo dos de los servicios de prevención del VIH mencionados anteriormente a través de ONG, proveedores sanitarios u otras fuentes						
Denominador : Número de profesionales del sexo que contestaron						

II. Datos de programas

	Valor de datos
Número de profesionales del sexo alcanzados por intervenciones de prevención del Sida a nivel de grupo de pequeño alcance y/o individuales concebidas para la población objetivo	58221
Número de preservativos distribuidos entre profesionales del sexo	873315

3.7.1 Número de centros de prestación de servicios dedicados a los profesionales del sexo

	Valor de datos
Número total de centros de prestación de servicios	7
- Centros operados por el programa nacional (gobierno)	
- Centros operados por la comunidad (sociedad civil u ONG)	7
Número de áreas administrativas con centros de prestación de servicios	
Número total de áreas administrativas en el país	

3.7B Cobertura de los programas de prevención del VIH entre los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Otros (especifique la estrategia y el lugar del muestreo)

Otra herramienta/fuente de medición:: Sistema de Registro de Poblaciones Clave

Desde la fecha: 01/01/2017

Hasta la fecha: 31/12/2017

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: Centros Especializados en servicios de HSH 1. ASA (Santo Domingo, Santiago) 2. Aid For AIDS 3. IDEV 4. CAE 5. Este Amor 6. COIN (Santo Domingo, Santiago) 7. INSALUD 8. CEPROSH (Puerto Plata y Dajabon) 9. FUMUDESJU

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

I. Vigilancia del comportamiento u otras encuestas especiales

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta: 130572

Tabla A. En los últimos tres meses, ¿se le han facilitado a usted preservativos y lubricante? (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de salud sexual)

	Todos	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que contestaron afirmativamente a la pregunta "En los últimos tres meses, ¿se le han facilitado a usted preservativos y lubricante? (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de salud sexual)"			
Numerador : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que contestaron afirmativamente			
Denominador : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que contestaron			

Tabla B. En los tres últimos meses, ¿ha recibido usted asesoramiento sobre el uso del preservativo y prácticas sexuales seguras? (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de salud sexual)

	Todos	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que contestaron afirmativamente a la pregunta "En los tres últimos meses, ¿ha recibido usted asesoramiento sobre el uso del preservativo y prácticas sexuales seguras? (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de salud sexual)"			
Numerador : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que contestaron afirmativamente			
Denominador : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que contestaron			

Tabla C. ¿Se ha sometido usted en los últimos tres meses a pruebas para la detección de infecciones de transmisión sexual?

	Todos	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que contestaron afirmativamente a la pregunta "¿Se ha sometido usted en los últimos tres meses a pruebas para la detección de infecciones de transmisión sexual?"			
Numerador : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que contestaron afirmativamente			
Denominador : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que contestaron			

Tabla D. Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que dan cuenta de haber recibido como mínimo dos de los servicios de prevención del VIH mencionados anteriormente a través de ONG, proveedores sanitarios u otras fuentes

	Todos	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de encuestados que reportan haber recibido como mínimo dos de los siguientes servicios de prevención del VIH a través de ONG, proveedores sanitarios u otras fuentes			
Numerador : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que dan cuenta de haber recibido como mínimo dos de los servicios de prevención del VIH mencionados anteriormente a través de ONG, proveedores sanitarios u otras fuentes			
Denominador : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que contestaron			

II. Datos de programas

	Valor de datos
Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres alcanzados por intervenciones de prevención del Sida a nivel de grupo de pequeño alcance y/o individuales concebidas para la población objetivo	84862
Número de preservativos + lubricante distribuidos entre hombres que tienen relaciones sexuales con hombres	1272930

3.7.1 Número de centros de prestación de servicios dedicados a los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres

	Valor de datos
Número total de centros de prestación de servicios	12
- Centros operados por el programa nacional (gobierno)	
- Centros operados por la comunidad (sociedad civil u ONG)	12
Número de áreas administrativas con centros de prestación de servicios	
Número total de áreas administrativas en el país	

3.7C Cobertura de los programas de prevención del VIH entre las personas que consumen drogas inyectables

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Otros (especifique la estrategia y el lugar del muestreo)

Otra herramienta/fuente de medición:: Base de Datos de la institución Meson de Dios.

Desde la fecha: 01/06/2017

Hasta la fecha: 31/07/2017

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: La información compartida en los indicadores de Programa mas abajo, corresponden al trabajo de dos meses del año 2017 de una Organización de la Sociedad Civil (Meson de Dios). Las actividades se realizaron en Dos provincias del país, Santo Domingo y Santiago.

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

I. Vigilancia del comportamiento u otras encuestas especiales

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta: 900

Tabla A. En los últimos tres meses, ¿se le han facilitado a usted preservativos y lubricante? (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de salud sexual)

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas que consumen drogas inyectables que contestaron afirmativamente a la pregunta "En los últimos tres meses, ¿se le han facilitado a usted preservativos y lubricante? (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de salud sexual)"						
Numerador : Número de personas que consumen drogas inyectables que contestaron afirmativamente						
Denominador : Número de personas que consumen drogas inyectables que contestaron						

Tabla B. En los tres últimos meses, ¿ha recibido usted asesoramiento sobre el uso del preservativo y prácticas sexuales seguras? (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de salud sexual)

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas que consumen drogas inyectables que contestaron afirmativamente a la pregunta "En los tres últimos meses, ¿ha recibido usted asesoramiento sobre el uso del preservativo y prácticas sexuales seguras? (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de salud sexual)"						
Numerador : Número de personas que consumen drogas inyectables que contestaron afirmativamente						
Denominador : Número de personas que consumen drogas inyectables que contestaron						

Tabla C. ¿Ha recibido usted agujas y jeringuillas nuevas y limpias en los últimos tres meses?

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas que consumen drogas inyectables que contestaron afirmativamente a la pregunta "¿Ha recibido usted agujas y jeringuillas nuevas y limpias en los últimos tres meses?"						
Numerador : Número de personas que consumen drogas inyectables que contestaron afirmativamente						
Denominador : Número de personas que consumen drogas inyectables que contestaron						

Tabla D. Porcentaje de personas que consumen drogas inyectables que dan cuenta de haber recibido como mínimo dos de los servicios de prevención del VIH mencionados anteriormente a través de ONG, proveedores sanitarios u otras fuentes

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de encuestados que reportan haber recibido como mínimo dos de los siguientes servicios de prevención del VIH a través de ONG, proveedores sanitarios u otras fuentes						
Numerador : Número de personas que consumen drogas inyectables que dan cuenta de haber recibido como mínimo dos de los servicios de prevención del VIH mencionados anteriormente a través de ONG, proveedores sanitarios u otras fuentes						
Denominador : Número de personas que consumen drogas inyectables que contestaron						

II. Datos de programas

	Valor de datos
Número de personas que usan drogas inyectables alcanzadas por intervenciones de prevención del Sida a nivel de grupo de pequeño alcance y/o individuales concebidas para la población objetivo	35
Número de agujas y jeringuillas distribuidas entre personas que usan drogas inyectables	254

3.7.1 Número de centros de prestación de servicios dedicados a las personas que consumen drogas inyectables

	Todos	TSO	Programas de agujas y jeringuillas
Número total de centros de prestación de servicios	5	2	3
- Centros operados por el programa nacional (gobierno)	1	1	0
- Centros operados por la comunidad (sociedad civil u ONG)	4	1	3
Número de áreas administrativas con centros de prestación de servicios			
Número total de áreas administrativas en el país			

3.7D Cobertura de los programas de prevención del VIH entre las personas transgénero

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Otros (especifique la estrategia y el lugar del muestreo)

Otra herramienta/fuente de medición:: Sistema de Registro de Poblaciones Clave, 2017

Desde la fecha: 01/01/2017

Hasta la fecha: 31/12/2017

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

I. Vigilancia del comportamiento u otras encuestas especiales

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta: 8891

Tabla A. En los últimos tres meses, ¿se le han facilitado a usted preservativos y lubricante? (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de salud sexual)

	Todos	hombres transgénero	mujeres transgénero	otro	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas transgénero que contestaron afirmativamente a la pregunta "En los últimos tres meses, ¿se le han facilitado a usted preservativos y lubricante? (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de salud sexual)"						
Numerador : Número de personas transgénero que contestaron afirmativamente						
Denominador : Número de personas transgénero que contestaron						

Tabla B. En los tres últimos meses, ¿ha recibido usted asesoramiento sobre el uso del preservativo y prácticas sexuales seguras? (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de salud sexual)

	Todos	hombres transgénero	mujeres transgénero	otro	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas transgénero que contestaron afirmativamente a la pregunta "En los tres últimos meses, ¿ha recibido usted asesoramiento sobre el uso del preservativo y prácticas sexuales seguras? (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de salud sexual)"						
Numerador : Número de personas transgénero que contestaron afirmativamente						
Denominador : Número de personas transgénero que contestaron						

Tabla C. ¿Se ha sometido usted en los últimos tres meses a pruebas para la detección de infecciones de transmisión sexual?

	Todos	hombres transgénero	mujeres transgénero	otro	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas transgénero que contestaron afirmativamente a la pregunta "¿Se ha sometido usted en los últimos tres meses a pruebas para la detección de infecciones de transmisión sexual?"						
Numerador : Número de personas transgénero que contestaron afirmativamente						
Denominador : Número de personas transgénero que contestaron						

Tabla D. Porcentaje de personas transgénero que dan cuenta de haber recibido como mínimo dos de los servicios de prevención del VIH mencionados anteriormente a través de ONG, proveedores sanitarios u otras fuentes

	Todos	hombres transgénero	mujeres transgénero	otro	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de encuestados que reportan haber recibido como mínimo dos de los siguientes servicios de prevención del VIH a través de ONG, proveedores sanitarios u otras fuentes						
Numerador : Número de personas transgénero que dan cuenta de haber recibido como mínimo dos de los servicios de prevención del VIH mencionados anteriormente a través de ONG, proveedores sanitarios u otras fuentes						
Denominador : Número de personas transgénero que contestaron						

II. Datos de programas

	Valor de datos
Número de personas transgénero alcanzados por intervenciones de prevención del Sida a nivel de grupo de pequeño alcance y/o individuales concebidas para la población objetivo	3200
Número de preservativos + lubricante distribuidos entre personas transgénero	57600

3.7.1 Número de centros de prestación de servicios dedicados a las personas transgénero

	Valor de datos
Número total de centros de prestación de servicios	
- Centros operados por el programa nacional (gobierno)	
- Centros operados por la comunidad (sociedad civil u ONG)	5
Número de áreas administrativas con centros de prestación de servicios	
Número total de áreas administrativas en el país	

3.8 Prácticas seguras en el consumo de drogas inyectables entre las personas que consumen drogas inyectables

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de usuarios de drogas inyectables que afirma haber utilizado equipos de inyección esterilizados la última vez que se inyectó drogas						
Numerador : Número de usuarios de drogas inyectables que afirman haber utilizado equipos de inyección esterilizados la última vez que se inyectaron drogas						
Denominador : Número de usuarios de drogas inyectables que afirman haberse inyectado drogas en el último mes						

Datos sub-nacionales

Total y desglose por edad

Introduzca el desglose por región abajo [añada las que sean necesarias]

Tipo de área	Nombre de área	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Total - Numerador	Total - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
--------------	----------------	----------------------	----------------	-------------------	---------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-------------------

Desglose por sexo

Introduzca el desglose por lugar en el mismo orden de la tabla que se encuentra más abajo [añada las líneas que sean necesarias]

Nombre de área	Hombres - Numerador	Hombres - Denominador	Mujeres - Numerador	Mujeres - Denominador	Hombres (<25) - Numerador	Hombres (<25) - Denominador	Mujeres (<25) - Numerador	Mujeres (<25) - Denominador
----------------	---------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------

3.9 Agujas y jeringuillas distribuidas por cada persona que consume drogas inyectables

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

	Total
Índice : Número de agujas y jeringas distribuidas por usuario de drogas inyectables por año y por programa de agujas y jeringas	
Numerador : Número de agujas y jeringas distribuidas en los últimos 12 meses por los Planes Estratégicos Nacionales	
Denominador : Número de usuarios de drogas inyectables en el país	

Datos sub-nacionales

Introduzca el desglose por región abajo [añada las que sean necesarias]

Tipo de área	Nombre de área	Años en los que se recopilan datos	Porcentaje (%)	Numerador	Denominador
--------------	----------------	------------------------------------	----------------	-----------	-------------

3.10 Cobertura de las terapias de sustitución de opiáceos

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Otros (especifique)

Otra herramienta/fuente de medición:: Base de datos del Centro de Atención Integral a la dependencias de sustancias legales y no legales (CAID).

Desde la fecha: 01/07/2017

Hasta la fecha: 31/12/2017

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: En la actualidad se lleva a cabo un Proyecto piloto modelo de tratamiento asistido por medicamentos y atención integral al VIH basado en evidencia científica para personas dependientes de drogas, opiáceos (heroína) en RD, implementándose en el Centro de Atención Integral a la dependencias de sustancias legales y no legales (CAID). Este proyecto beneficia a 70 personas.

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de usuarios de drogas inyectables que reciben terapia de sustitución de opiáceos	7.8					
Numerador : Número de usuarios de drogas inyectables que reciben terapia de sustitución de opiáceos en un momento determinado.	70					
Denominador : Número de personas que tienen dependencia de los opiáceos que usan drogas inyectables en el país	900					

Datos sub-nacionales

Total y desglose por edad

Introduzca el desglose por región abajo [añada las que sean necesarias]

Tipo de área	Nombre de área	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Total - Numerador	Total - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
--------------	----------------	----------------------	----------------	-------------------	---------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-------------------

Desglose por sexo

Introduzca el desglose por lugar en el mismo orden de la tabla que se encuentra más abajo [añada las líneas que sean necesarias]

Nombre de área	Hombres - Numerador	Hombres - Denominador	Mujeres - Numerador	Mujeres - Denominador	Hombres (<25) - Numerador	Hombres (<25) - Denominador	Mujeres (<25) - Numerador	Mujeres (<25) - Denominador
----------------	---------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------

3.11 Sífilis activa entre profesionales del sexo

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero
Porcentaje (%) : Porcentaje de profesionales del sexo con sífilis activa				
Numerador : Número de profesionales del sexo que han tenido resultados positivos en pruebas de detección de sífilis activa				
Denominador : Número de profesionales del sexo que se han sometido a pruebas de detección de sífilis activa				

3.12 Sífilis activa entre los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

	Valor de datos
Porcentaje (%) : Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres con cuadros de sífilis activa	
Numerador : Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que han recibido resultados positivos en pruebas para la detección de sífilis activa	
Denominador : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que se han sometido a pruebas para la detección de sífilis activa	

3.13 Programas de prevención del VIH en prisiones

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Datos de programas rutinarios

Otra herramienta/fuente de medición:: Sistema de Registro de Poblaciones Clave (SRPC) Sistema Unico de Registro de los Servicios de Atención Integral.

Desde la fecha: 01/01/2017

Hasta la fecha: 31/12/2017

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

	Valor de datos
Número de agujas limpias distribuidas entre presos	0
Número de presos que reciben terapias de sustitución de opiáceos	0
Número de preservativos distribuidos entre presos	22519
Número de presos que reciben terapias antirretrovirales	53
Numero de presos sometidos a pruebas sobre el VIH	8975

Personas que viven con el VIH de entre los presos

	Valor de datos
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas que viven con el VIH de entre los presos	
Numerador : Número de personas que viven con el VIH de entre los presos	93

Sólo reclusos con hepatitis B

	Valor de datos
Porcentaje (%) : Porcentaje de presos que sufren hepatitis B	
Numerador : Número de presos que sufren hepatitis B	

Presos con hepatitis C o que presentan coinfección por VIH y virus de la hepatitis C

	Valor de datos
Porcentaje (%) : Porcentaje de presos que presentan coinfección por VIH y virus de la hepatitis B	
Numerador : Número de presos que presentan coinfección por VIH y virus de la hepatitis B	

Sólo reclusos con hepatitis C

	Valor de datos
Porcentaje (%) : Porcentaje de presos que sufren hepatitis C	
Numerador : Número de presos que sufren hepatitis C	

Presos con hepatitis C o que presentan coinfección por VIH y virus de la hepatitis C

	Valor de datos
Porcentaje (%) : Porcentaje de presos que presentan coinfección por VIH y virus de la hepatitis C	
Numerador : Número de presos que presentan coinfección por VIH y virus de la hepatitis C	

Presos con TB o que presentan coinfección por VIH y TB

	Valor de datos
Porcentaje (%) : Porcentaje de presos que sufren TB o que presentan coinfección por VIH y TB	
Numerador : Número de presos que sufren TB o que presentan coinfección por VIH y TB	

3.14 Hepatitis vírica entre grupos de población clave

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Hepatitis B

	Personas que se inyectan drogas - Total	Personas que se inyectan drogas - Hombres	Personas que se inyectan drogas - Mujeres	Personas que se inyectan drogas - Transgénero	Personas que se inyectan drogas - <25	Personas que se inyectan drogas - 25+	Profesionales del sexo	Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres	Personas transgénero
Porcentaje (%) : Prevalencia de la coinfección por VIH y virus de la hepatitis B entre grupos de población clave									
Numerador : Número de personas de un grupo de población clave que dan positivo en la prueba de antígeno de superficie de la hepatitis B y que también dan positivo en la prueba del VIH									
Denominador : Número de encuestados que se han sometido a pruebas para tanto el VIH como la hepatitis B									

Hepatitis C

Algoritmo de pruebas para la detección de la hepatitis C:

	Personas que se inyectan drogas - Total	Personas que se inyectan drogas - Hombres	Personas que se inyectan drogas - Mujeres	Personas que se inyectan drogas - Transgénero	Personas que se inyectan drogas - <25	Personas que se inyectan drogas - 25+	Profesionales del sexo	Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres	Personas transgénero
Porcentaje (%) : Prevalencia de la coinfección por VIH y virus de la hepatitis C entre grupos de población clave									
Numerador : Número de personas de un grupo de población clave que dan positivo en anticuerpos del virus de la hepatitis C y que también dan positivo en la prueba del VIH									
Denominador : Número de encuestados que se han sometido a pruebas para tanto el VIH como la hepatitis C									

3.15 Personas que recibieron PrEP

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:

Número de personas que recibieron la PrEP al menos una vez durante el período que abarca el informe

	Total	Hombres	Mujeres	Transgénero	Sexo desconocido	Número de personas que recibieron la PrEP por primera vez en sus vidas durante el período que abarca el informe
Todo						
15-19						
20-24						
25-49						
50+						
Si no se dispone de desgloses por grupos de edad específicos, sírvase indicar el número total de personas que recibieron PrEP de 15 años o más.						
Edad desconocida						
Número de personas que recibieron la PrEP por primera vez en sus vidas durante el período que abarca el informe						

Desagregación por grupo de población clave

	Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres	Profesionales del sexo	Personas transgénero	Personas que se inyectan drogas
Número de personas que recibieron la PrEP al menos una vez durante el período que abarca el informe				

Datos sub-nacionales

Introduzca el desglose según región subnacional a continuación [Añada todas las que sean necesarias]

Región sub-nacional	Todo	Hombres	Mujeres	Transgénero	Sexo desconocido
---------------------	------	---------	---------	-------------	------------------

Alternativamente, puede [descargar este formato](#), completar las columnas y adjuntarlo utilizando el botón "Agregar archivo"

Datos específicos de ciudades

Aporte información para la ciudad capital así como para una o dos ciudades más que sean clave por su alta relevancia epidemiológica

Ciudad	Número de personas que recibieron la PrEP al menos una vez durante el período que abarca el informe
--------	---

3.18 Uso del preservativo en la última relación sexual de alto riesgo

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todos (15-49)	Hombres (15-49)	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Hombres (25-49)	Mujeres (15-49)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)	Mujeres (25-49)
Porcentaje (%) : El porcentaje de encuestados que reportan haber utilizado un preservativo en la última ocasión en que mantuvieron relaciones sexuales con una pareja no conyugal, con la que no conviven, entre las personas que hayan mantenido relaciones sexuales con este tipo de pareja en los anteriores 12 meses									
Numerador : El número de encuestados que reportan haber utilizado un preservativo en la última ocasión en que mantuvieron relaciones sexuales con una pareja no conyugal con la que no conviven									
Denominador : Número total de encuestados que reportan haber mantenido relaciones sexuales con una pareja no conyugal con la que no conviven, en los anteriores doce meses									

4.1 Actitudes discriminatorias hacia las personas que viven con el VIH

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

Respuestas "No" a la pregunta número 1 "¿Comprarías verduras frescas a un vendedor si supiera que esta persona tiene VIH?"

	Todos (15-49)	Hombres (15-49)	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Hombres (25-49)	Mujeres (15-49)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)	Mujeres (25-49)
Porcentaje (%) : Porcentaje de entrevistados (de 15 a 49 años) que respondieron "No" a la pregunta 1									
Numerador : Número de entrevistados (de 15 a 49 años) que respondieron "No" a la pregunta 1									
Denominador : Número de entrevistados de 15 a 49 años que han oído hablar del VIH									
Respondieron "No lo sé", "No estoy seguro" o "Depende" : Número de entrevistados (de 15 a 49 años) que respondió "no lo sé", "no estoy seguro", o "depende" a la pregunta 1									

Herramienta/fuente de medición de datos para la Pregunta 2 (si es diferente de la fuente de medición indicada más arriba):

Si la herramienta/fuente de medición de datos para la Pregunta 2 es "otra", especifíquela:

Respuestas "No" a la pregunta número 2 "¿Cree que los niños que viven con el VIH deben acudir a la escuela con niños seronegativos?"

	Todos	Hombres (15-49)	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Hombres (25-49)	Mujeres (15-49)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)	Mujeres (25-49)
Porcentaje (%) : Porcentaje de entrevistados (de 15 a 49 años) que respondieron "No" a la pregunta 2									
Numerador : Número de entrevistados (de 15 a 49 años) que respondieron "No" a la pregunta 2									
Denominador : Número de entrevistados de 15 a 49 años que han oído hablar del VIH									
Respondieron "No lo sé", "No estoy seguro" o "Depende" : Número de entrevistados (de 15 a 49 años) que respondió "no lo sé", "no estoy seguro", o "depende" a la pregunta 2									

Respondieron "No" a alguna pregunta

	Todos	Hombres (15-49)	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Hombres (25-49)	Mujeres (15-49)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)	Mujeres (25-49)
Porcentaje (%) : Porcentaje de entrevistados (de 15 a 49 años) que respondieron "No" a cualquiera de las dos preguntas									
Numerador : Número de entrevistados (de 15 a 49 años) que respondieron "No" a cualquiera de las dos preguntas									
Denominador : Número de entrevistados de 15 a 49 años que han oído hablar del VIH									

4.2A Evitación de atención sanitaria debido al estigma y la discriminación de los profesionales del sexo

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

Evitación de la atención sanitaria

Motivo de anulación incluido en la pregunta de la encuesta:

Plazos incluidos en la pregunta de la encuesta:

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de profesionales del sexo que evitaron buscar atención médica en los últimos 12 meses						
Numerador : Número de profesionales del sexo que informaron haber evitado buscar atención médica en los últimos 12 meses						
Denominador : Número de encuestados						

Evitación de las pruebas del VIH

Motivo de anulación incluido en la pregunta de la encuesta:

Plazos incluidos en la pregunta de la encuesta:

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de profesionales del sexo que evitaron hacerse las pruebas del VIH en los últimos 12 meses						
Numerador : Número de profesionales del sexo que declaran haber evitado hacerse las pruebas del VIH en los últimos 12 meses						
Denominador : Número de profesionales del sexo que declaran no haberse hecho las pruebas del VIH en los últimos 12 meses						

Evitación de la atención médica para el VIH

Motivo de anulación incluido en la pregunta de la encuesta:

Plazos incluidos en la pregunta de la encuesta:

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de profesionales del sexo que viven con el VIH y que evitaron recibir atención médica para el VIH en los últimos 12 meses						
Numerador : Número de profesionales del sexo que viven con el VIH y que declaran haber evitado recibir atención médica para el VIH en los últimos 12 meses						
Denominador : Número de profesionales del sexo que declaran vivir con el VIH y nunca haber recibido ni haber dejado de recibir atención médica para el VIH						
Denominador (2) : Número de profesionales del sexo que informaron haber vivido con el VIH						

Evitación del tratamiento para el VIH

Motivo de anulación incluido en la pregunta de la encuesta:

Plazos incluidos en la pregunta de la encuesta:

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de profesionales del sexo que viven con el VIH que evitaron recurrir al tratamiento para el VIH en los últimos 12 meses						
Numerador : Número de profesionales del sexo que viven con el VIH y que declaran haber evitado recibir tratamiento para el VIH en los últimos 12 meses						
Denominador : Número de profesionales del sexo que declaran vivir con el VIH y nunca haber recibido ni haber dejado de recibir tratamiento para el VIH						
Denominador (2) : Número de profesionales del sexo que informaron haber vivido con el VIH						

Datos específicos de ciudades

Introduzca el desglose por región abajo [añada las que sean necesarias]

Sitio/Ciudad	Año de la encuesta	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Numerador	Denominador	Servicio evitado	De ser otra, sírvase indicarla
--------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------	-------------	------------------	--------------------------------

4.2B Evitación de atención sanitaria debido al estigma y la discriminación de los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

Evitación de la atención sanitaria

Motivo de anulación incluido en la pregunta de la encuesta:

Plazos incluidos en la pregunta de la encuesta:

	Todos	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que evitaron buscar atención médica en los últimos 12 meses			
Numerador : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que informaron haber evitado buscar atención médica en los últimos 12 meses			
Denominador : Número de encuestados			

Evitación de las pruebas del VIH

Motivo de anulación incluido en la pregunta de la encuesta:

Plazos incluidos en la pregunta de la encuesta:

	Todos	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que evitaron hacerse las pruebas del VIH en los últimos 12 meses			
Numerador : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que declaran haber evitado hacerse las pruebas del VIH en los últimos 12 meses			
Denominador : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que declaran no haberse hecho las pruebas del VIH en los últimos 12 meses			

Evitación de la atención médica para el VIH

Motivo de anulación incluido en la pregunta de la encuesta:

Plazos incluidos en la pregunta de la encuesta:

	Todos	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que viven con el VIH y que evitaron recibir atención médica para el VIH en los últimos 12 meses			
Numerador : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que viven con el VIH y que declaran haber evitado recibir atención médica para el VIH en los últimos 12 meses			
Denominador : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que declaran vivir con el VIH y nunca haber recibido ni haber dejado de recibir atención médica para el VIH			
Denominador (2) : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que informaron haber vivido con el VIH			

Evitación del tratamiento para el VIH

Motivo de anulación incluido en la pregunta de la encuesta:

Plazos incluidos en la pregunta de la encuesta:

	Todos	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que viven con el VIH y que evitaron recurrir al tratamiento para el VIH en los últimos 12 meses			
Numerador : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que viven con el VIH y que declaran haber evitado recibir tratamiento para el VIH en los últimos 12 meses			
Denominador : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que declaran vivir con el VIH y nunca haber recibido ni haber dejado de recibir tratamiento para el VIH			
Denominador (2) : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que informaron haber vivido con el VIH			

Datos específicos de ciudades

Introduzca el desglose por región abajo [añada las que sean necesarias]

Sitio/Ciudad	Año de la encuesta	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Numerador	Denominador	Servicio evitado	De ser otra, sírvase indicarla
--------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------	-------------	------------------	--------------------------------

4.2C Evitación de atención sanitaria debido al estigma y la discriminación de las personas que se inyectan drogas

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

Evitación de la atención sanitaria

Motivo de anulación incluido en la pregunta de la encuesta:

Plazos incluidos en la pregunta de la encuesta:

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas que se inyectaron drogas y evitaron buscar asistencia sanitaria en los últimos 12 meses						
Numerador : Número de personas que se inyectaron drogas que informaron haber evitado buscar atención médica en los últimos 12 meses						
Denominador : Número de encuestados						

Evitación de las pruebas del VIH

Motivo de anulación incluido en la pregunta de la encuesta:

Plazos incluidos en la pregunta de la encuesta:

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas que consumen drogas inyectables que evitaron hacerse las pruebas del VIH en los últimos 12 meses						
Numerador : Número de personas que consumen drogas inyectables que declaran haber evitado hacerse las pruebas del VIH en los últimos 12 meses						
Denominador : Número de personas que consumen drogas inyectables que declaran no haberse hecho las pruebas del VIH en los últimos 12 meses						

Evitación de la atención médica para el VIH

Motivo de anulación incluido en la pregunta de la encuesta:

Plazos incluidos en la pregunta de la encuesta:

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas que consumen drogas inyectables que viven con el VIH y que evitaron recibir atención médica para el VIH en los últimos 12 meses						
Numerador : Número de personas que consumen drogas inyectables que viven con el VIH y que declaran haber evitado recibir atención médica para el VIH en los últimos 12 meses						
Denominador : Número de personas que consumen drogas inyectables que declaran vivir con el VIH y nunca haber recibido ni haber dejado de recibir atención médica para el VIH						
Denominador (2) : Número de personas que se inyectaron drogas y reportaron haber vivido con el VIH						

Evitación del tratamiento para el VIH

Motivo de anulación incluido en la pregunta de la encuesta:

Plazos incluidos en la pregunta de la encuesta:

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas que consumen drogas inyectables que viven con el VIH y que evitaron recurrir al tratamiento para el VIH en los últimos 12 meses						
Numerador : Número de personas que consumen drogas inyectables que viven con el VIH y que declaran haber evitado recibir tratamiento para el VIH en los últimos 12 meses						
Denominador : Número de personas que consumen drogas inyectables que declaran vivir con el VIH y nunca haber recibido ni haber dejado de recibir tratamiento para el VIH						
Denominador (2) : Número de personas que se inyectaron drogas y reportaron haber vivido con el VIH						

Datos específicos de ciudades

Introduzca el desglose por región abajo [añada las que sean necesarias]

Sitio/Ciudad	Año de la encuesta	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Numerador	Denominador	Servicio evitado	De ser otra, sírvase indicarla
--------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------	-------------	------------------	--------------------------------

4.2D Evitación de atención sanitaria debido al estigma y la discriminación de las personas transgénero

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

Evitación de la atención sanitaria

Motivo de anulación incluido en la pregunta de la encuesta:

Plazos incluidos en la pregunta de la encuesta:

	Todos	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que evitaron buscar atención médica en los últimos 12 meses			
Numerador : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que informaron haber evitado buscar atención médica en los últimos 12 meses			
Denominador : Número de encuestados			

Evitación de las pruebas del VIH

Motivo de anulación incluido en la pregunta de la encuesta:

Plazos incluidos en la pregunta de la encuesta:

	Todos	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas transgénero que evitaron hacerse las pruebas del VIH en los últimos 12 meses			
Numerador : Número de personas transgénero que declaran haber evitado hacerse las pruebas del VIH en los últimos 12 meses			
Denominador : Número de personas transgénero que declaran no haberse hecho las pruebas del VIH en los últimos 12 meses			

Evitación de la atención médica para el VIH

Motivo de anulación incluido en la pregunta de la encuesta:

Plazos incluidos en la pregunta de la encuesta:

	Todos	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas transgénero que viven con el VIH y que evitaron recibir atención médica para el VIH en los últimos 12 meses			
Numerador : Número de personas transgénero que viven con el VIH y que declaran haber evitado recibir atención médica para el VIH en los últimos 12 meses			
Denominador : Número de personas transgénero que declaran vivir con el VIH y nunca haber recibido ni haber dejado de recibir atención médica para el VIH			

Evitación del tratamiento para el VIH

Motivo de anulación incluido en la pregunta de la encuesta:

Plazos incluidos en la pregunta de la encuesta:

	Todos	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas transgénero que viven con el VIH que evitaron recurrir al tratamiento para el VIH en los últimos 12 meses			
Numerador : Número de personas transgénero que viven con el VIH y que declaran haber evitado recibir tratamiento para el VIH en los últimos 12 meses			
Denominador : Número de personas transgénero que declaran vivir con el VIH y nunca haber recibido ni haber dejado de recibir tratamiento para el VIH			

Datos específicos de ciudades

Introduzca el desglose por región abajo [añada las que sean necesarias]

Sitio/Ciudad	Año de la encuesta	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Numerador	Denominador	Servicio evitado	De ser otra, sírvase indicarla
--------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------	-------------	------------------	--------------------------------

4.3 Prevalencia de violencia reciente por parte de una pareja íntima

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

Prevalencia de la violencia por parte de un compañero sentimental

	Mujeres (15-49)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)	Mujeres (25-49)
Porcentaje (%) : Proporción de mujeres de entre 15 y 49 años de edad que han estado casadas o tenido pareja en alguna ocasión y que han sufrido violencia física o sexual por parte de una pareja masculina en los últimos 12 meses				
Numerador : Mujeres de entre 15 y 49 años de edad que tienen o han tenido una pareja sexual y que afirman haber sufrido violencia física o sexual por parte de dicha pareja en los últimos 12 meses				
Denominador : Número total de mujeres encuestadas de entre 15 y 49 años de edad que tienen o han tenido una pareja sexual				

Prevalencia de la violencia por parte de un compañero sentimental desagregada por estado del VIH

	Mujeres seropositivas (15-49)	Mujeres seronegativas (15-49)	Mujeres que no conocen su estado respecto al VIH (15-49)	Mujeres seropositivas (15-19)	Mujeres seronegativas (15-19)	Mujeres que no conocen su estado respecto al VIH (15-19)	Mujeres seropositivas (20-24)	Mujeres seronegativas (20-24)	Mujeres que no conocen su estado respecto al VIH (20-24)	Mujeres seropositivas (25-49)	Mujeres seronegativas (25-49)	Mujeres que no conocen su estado respecto al VIH (25-49)
Porcentaje (%) : Proporción de mujeres de entre 15 y 49 años de edad que han estado casadas o tenido pareja en alguna ocasión y que han sufrido violencia física o sexual por parte de una pareja masculina en los últimos 12 meses												
Numerador : Mujeres de entre 15 y 49 años de edad que tienen o han tenido una pareja sexual y que afirman haber sufrido violencia física o sexual por parte de dicha pareja en los últimos 12 meses												
Denominador : Número total de mujeres encuestadas de entre 15 y 49 años de edad que tienen o han tenido una pareja sexual												

4.4 Experiencia de discriminación relacionada con el VIH en entornos de atención de la salud

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Desagregados por tipo de servicio de salud

	Servicios de salud relacionados con el VIH	Servicios de salud no relacionados con el VIH
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas que viven con el VIH que informan haber sufrido estigma y discriminación en los últimos 12 meses		
Numerador : Número de personas que respondieron afirmativamente a al menos una de las siguientes preguntas		
Número de personas que respondieron "Sí" a: "Negación de atención debido al estado serológico respecto al VIH"		
Número de personas que respondieron "Sí" a: "Se les aconseja no tener relaciones sexuales debido a su estado serológico respecto al VIH"		
Número de personas que respondieron "Sí" a: "Hablaron mal o murmuraron acerca de la situación del VIH"		
Número de personas que respondieron afirmativamente a: "Abuso verbal debido a la condición de VIH"		
Número de personas que respondieron afirmativamente a: "Abuso físico debido a la condición de VIH"		
Número de personas que respondieron "Sí" a: "Evitar el contacto físico debido al estado serológico respecto al VIH"		
Número de personas que respondieron "Sí" a: "Informar a otros sobre el estado serológico respecto al VIH sin consentimiento"		
Denominador : Número de encuestados		

Experiencia en servicios de salud relacionados con el VIH: desagregados por género, edad y población clave

	Hombres	Mujeres	Transgénero	15-19	20-24	25-49	Poblaciones clave (Respuesta identificada con al menos una población clave)
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas que viven con el VIH que informan haber sufrido estigma y discriminación en los últimos 12 meses							
Numerador : Número de personas que respondieron afirmativamente a al menos una de las siete preguntas							
Denominador : Número de encuestados							

Experiencia en servicios de salud relacionados con el VIH: desagregados por duración de vida con el VIH

	0-1 año	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20+ años
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas que viven con el VIH que informan haber sufrido estigma y discriminación en los últimos 12 meses						
Numerador : Número de personas que respondieron afirmativamente a al menos una de las siete preguntas						
Denominador : Número de encuestados						

Experiencia en servicios de salud no relacionados con el VIH: desagregados por género, edad y población clave.

	Hombres	Mujeres	Transgénero	15-19	20-24	25-49	Poblaciones clave (Respuesta identificada con al menos una población clave)
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas que viven con el VIH que informan haber sufrido estigma y discriminación en los últimos 12 meses							
Numerador : Número de personas que respondieron afirmativamente a al menos una de las siete preguntas							
Denominador : Número de encuestados							

Experiencia en servicios de salud no relacionados con el VIH: desagregados por duración de vida con el VIH.

	0-1 año	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20+ años
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas que viven con el VIH que informan haber sufrido estigma y discriminación en los últimos 12 meses						
Numerador : Número de personas que respondieron afirmativamente a al menos una de las siete preguntas						
Denominador : Número de encuestados						

LAC2.3.1bA Discriminación experimentada por las trabajadoras sexuales en los servicios de salud en los últimos 12 meses

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

Tabla A. Pregunta: 1. En los últimos 12 meses, ¿le han negado los servicios de salud que necesitaba o solicitó porque es trabajadora sexual?

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de encuestados que respondieron "Sí" a la pregunta "En los últimos 12 meses, ¿le han negado los servicios de salud que necesitaba o solicitó porque es trabajadora sexual?"						
Numerador : Número de encuestados que respondieron "Sí"						
Denominador : Cantidad de encuestados						

Tabla B. Pregunta: 2. En los últimos 12 meses, ¿ha experimentado hostilidad o rechazo por parte del personal administrativo de un establecimiento de salud porque usted es trabajadora sexual?

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de encuestados que respondieron "Sí" a la pregunta "2. En los últimos 12 meses, ¿ha experimentado hostilidad o rechazo por parte del personal administrativo de un establecimiento de salud porque usted es trabajadora sexual?"						
Numerador : Número de encuestados que respondieron "Sí"						
Denominador : Cantidad de encuestados						

Tabla C. Pregunta: 3. En los últimos 12 meses, ¿un profesional de la salud o personal administrativo le dijo a otras personas, sin su consentimiento, que usted es trabajadora sexual?

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de encuestados que respondieron "Sí" a la pregunta "¿En los últimos 12 meses, un profesional de la salud o personal administrativo le ha dicho a otras personas, sin su consentimiento, que usted es trabajadora sexual?"						
Numerador : Número de encuestados que respondieron "Sí"						
Denominador : Cantidad de encuestados						

Tabla D. Porcentaje de encuestados que informaron haber experimentado al menos uno de los anteriores en los últimos 12 meses

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de encuestados que informaron haber experimentado al menos uno de los anteriores						
Numerador : Número de encuestados que respondieron "Sí"						
Denominador : Cantidad de encuestados						

Datos sub-nacionales

Introduzca el desglose por región abajo [añada las que sean necesarias]

Tipo de área	Nombre de área	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Total - Numerador	Total - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
--------------	----------------	----------------------	----------------	-------------------	---------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-------------------

LAC2.3.1bB Discriminación experimentada por hombres que tienen sexo con hombres en servicios de salud en los últimos 12 meses

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

Tabla A. Pregunta: 1. En los últimos 12 meses, ¿le han negado servicios de salud que necesitaba o solicitó porque tiene relaciones sexuales con hombres?

	Todos	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de encuestados que respondieron "Sí" a la pregunta "En los últimos 12 meses, ¿le han negado los servicios de salud que necesitaba o solicitó porque tiene relaciones sexuales con hombres?"			
Numerador : Número de encuestados que respondieron "Sí"			
Denominador : Cantidad de encuestados			

Tabla B. Pregunta: 2. En los últimos 12 meses, ¿ha experimentado hostilidad o rechazo por parte del personal administrativo de un establecimiento de salud porque tiene relaciones sexuales con hombres?

	Todos	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de encuestados que respondieron "Sí" a la pregunta "En los últimos 12 meses, ¿ha experimentado hostilidad o rechazo por parte del personal administrativo de un establecimiento de salud porque tiene relaciones sexuales con hombres?"			
Numerador : Número de encuestados que respondieron "Sí"			
Denominador : Cantidad de encuestados			

Tabla C. Pregunta: 3. En los últimos 12 meses, ¿un profesional de la salud o personal administrativo le dijo a otras personas, sin su consentimiento, que usted tiene relaciones sexuales con hombres?

	Todos	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de encuestados que respondieron "Sí" a la pregunta "¿En los últimos 12 meses, un profesional de la salud o personal administrativo le ha dicho a otras personas, sin su consentimiento, que usted tiene relaciones sexuales con hombres?"			
Numerador : Número de encuestados que respondieron "Sí"			
Denominador : Cantidad de encuestados			

Tabla D. Porcentaje de encuestados que informaron haber experimentado al menos uno de los anteriores en los últimos 12 meses

	Todos	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de encuestados que informaron haber experimentado al menos uno de los anteriores			
Numerador : Número de encuestados que respondieron "Sí"			
Denominador : Cantidad de encuestados			

Datos sub-nacionales

Introduzca el desglose por región abajo [añada las que sean necesarias]

Tipo de área	Nombre de área	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Total - Numerador	Total - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
--------------	----------------	----------------------	----------------	-------------------	---------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-------------------

LAC2.3.1bC Discriminación que sufren las personas que se inyectan drogas en los servicios de salud en los últimos 12 meses

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

Tabla A. Pregunta: 1. En los últimos 12 meses, ¿le han negado los servicios de salud que necesitaba o solicitó porque se inyecta drogas?

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de encuestados que respondieron "Sí" a la pregunta "En los últimos 12 meses, ¿le han negado servicios de salud que necesitaba o solicitó porque se inyectó drogas?"						
Numerador : Número de encuestados que respondieron "Sí"						
Denominador : Cantidad de encuestados						

Tabla B. Pregunta: 2. En los últimos 12 meses, ¿ha experimentado hostilidad o rechazo por parte del personal administrativo de un establecimiento de salud porque se inyecta drogas?

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de encuestados que respondieron "Sí" a la pregunta "En los últimos 12 meses, ¿ha experimentado hostilidad o rechazo por parte del personal administrativo de un establecimiento de salud porque se inyecta drogas?"						
Numerador : Número de encuestados que respondieron "Sí"						
Denominador : Cantidad de encuestados						

Tabla C. Pregunta: 3. En los últimos 12 meses, ¿un profesional de la salud o personal administrativo le dijo a otras personas sin su consentimiento que usted se inyecta drogas?

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de encuestados que respondieron "Sí" a la pregunta "¿En los últimos 12 meses, un profesional de la salud o personal administrativo le ha dicho a otras personas sin su consentimiento que usted se inyecta drogas?"						
Numerador : Número de encuestados que respondieron "Sí"						
Denominador : Cantidad de encuestados						

Tabla D. Porcentaje de encuestados que informaron haber experimentado al menos uno de los anteriores en los últimos 12 meses

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de encuestados que informaron haber experimentado al menos uno de los anteriores						
Numerador : Número de encuestados que respondieron "Sí"						
Denominador : Cantidad de encuestados						

Datos sub-nacionales

Introduzca el desglose por región abajo [añada las que sean necesarias]

Tipo de área	Nombre de área	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Total - Numerador	Total - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
--------------	----------------	----------------------	----------------	-------------------	---------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-------------------

LAC2.3.1bD Discriminación experimentada por personas transgénero en los servicios de salud en los últimos 12 meses

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

Tabla A. Pregunta: 1. En los últimos 12 meses, ¿le han negado servicios de salud que necesitaba o solicitó porque es una persona transgénero?

	Todos	hombres transgénero	mujeres transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de encuestados que respondieron "Sí" a la pregunta "En los últimos 12 meses, ¿le han negado los servicios de salud que necesitaba o solicitó porque es una persona transgénero?"					
Numerador : Número de encuestados que respondieron "Sí"					
Denominador : Cantidad de encuestados					

Tabla B. Pregunta: En los últimos 12 meses, ¿ha experimentado hostilidad o rechazo por parte del personal administrativo de un establecimiento de salud porque usted es una persona transgénero?

	Todos	hombres transgénero	mujeres transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de encuestados que respondieron "Sí" a la pregunta "En los últimos 12 meses, ¿ha experimentado hostilidad o rechazo por parte del personal administrativo de un establecimiento de salud porque usted es una persona transgénero?"					
Numerador : Número de encuestados que respondieron "Sí"					
Denominador : Cantidad de encuestados					

Tabla C. Pregunta: 3. En los últimos 12 meses, ¿un profesional de la salud o personal administrativo le ha dicho a otras personas, sin su consentimiento, que usted es una persona transgénero?

	Todos	hombres transgénero	mujeres transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de encuestados que respondieron "Sí" a la pregunta "¿En los últimos 12 meses, un profesional de atención médica o personal administrativo le ha dicho a otras personas, sin su consentimiento, que usted es una persona transgénero?"					
Numerador : Número de encuestados que respondieron "Sí"					
Denominador : Cantidad de encuestados					

Tabla D. Porcentaje de encuestados que informaron haber experimentado al menos uno de los anteriores en los últimos 12 meses

	Todos	hombres transgénero	mujeres transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de encuestados que informaron haber experimentado al menos uno de los anteriores					
Numerador : Número de encuestados que respondieron "Sí"					
Denominador : Cantidad de encuestados					

Datos sub-nacionales

Introduzca el desglose por región abajo [añada las que sean necesarias]

Tipo de área	Nombre de área	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Total - Numerador	Total - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
--------------	----------------	----------------------	----------------	-------------------	---------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-------------------

LAC2.3.1bE Discriminación experimentada por una población vulnerable en los servicios de salud en los últimos 12 meses

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Población vulnerable a la que se refiere la encuesta:

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

Tabla A. Pregunta: 1. En los últimos 12 meses, ¿le han negado servicios de salud que necesitaba o solicitó porque usted es un miembro de esta población vulnerable?

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de encuestados que respondieron "Sí" a la pregunta "¿En los últimos 12 meses, le han negado los servicios de salud que necesitaba o solicitó porque usted es un miembro de esta población vulnerable?"						
Numerador : Número de encuestados que respondieron "Sí"						
Denominador : Cantidad de encuestados						

Tabla B. Pregunta: 2. En los últimos 12 meses, ¿ha experimentado hostilidad o rechazo por parte del personal administrativo en un establecimiento de salud porque usted es un miembro de esta población vulnerable?

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de encuestados que respondieron "Sí" a la pregunta "En los últimos 12 meses, ¿ha experimentado hostilidad o rechazo por parte del personal administrativo de un establecimiento de salud porque usted es un miembro de esta población vulnerable?"						
Numerador : Número de encuestados que respondieron "Sí"						
Denominador : Cantidad de encuestados						

Tabla C. Pregunta: 3. En los últimos 12 meses, ¿un profesional de la salud o personal administrativo le dijo a otras personas sin su consentimiento que usted es un miembro de esta población vulnerable?

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de encuestados que respondieron "Sí" a la pregunta "¿En los últimos 12 meses, un profesional de la salud o personal administrativo le ha dicho a otras personas sin su consentimiento que usted es un miembro de esta población vulnerable?"						
Numerador : Número de encuestados que respondieron "Sí"						
Denominador : Cantidad de encuestados						

Tabla D. Porcentaje de encuestados que informaron haber experimentado al menos uno de los anteriores en los últimos 12 meses

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de encuestados que informaron haber experimentado al menos uno de los anteriores						
Numerador : Número de encuestados que respondieron "Sí"						
Denominador : Cantidad de encuestados						

Datos sub-nacionales

Introduzca el desglose por región abajo [añada las que sean necesarias]

Tipo de área	Nombre de área	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Total - Numerador	Total - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
--------------	----------------	----------------------	----------------	-------------------	---------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-------------------

LAC4.1.1 Actos violentos contra personas LGBTI reportados en los últimos 12 meses

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: National Human Rights Observatory

Otra herramienta/fuente de medición:: Base de datos del Observatorio Nacional de Derechos Humanos

Desde la fecha: 01/01/2017

Hasta la fecha: 31/12/2017

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Número de actos violentos contra personas LGBTI reportados en los últimos 12 meses

	Todos	<25	25+
Todos	29		
Lesbianas	3		
Hombres gay	11		
Hombres bisexuales	0		
Mujeres bisexuales	0		
Hombres trans	0		
Mujeres trans	15		
Personas intersexuales	0		

Datos sub-nacionales

Introduzca el desglose por región abajo [añada las que sean necesarias]

Tipo de área	Nombre de área	Todos	Lesbianas	Hombres gay	Hombres bisexuales	Mujeres bisexuales	Hombres trans	Mujeres trans	Personas intersexuales
--------------	----------------	-------	-----------	-------------	--------------------	--------------------	---------------	---------------	------------------------

LAC5.1.1 Denuncias de violaciones de derechos humanos hacia personas que viven con VIH y poblaciones clave resueltas en los últimos 12 meses

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: National Human Rights Observatory

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha: 01/01/2017

Hasta la fecha: 31/12/2017

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Porcentaje de casos denunciados de violaciones de derechos humanos hacia personas que viven con el VIH y poblaciones clave que se han resuelto en los últimos 12 meses

	Todos	Personas que viven con el VIH	Profesionales del sexo	Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres	Personas que se inyectan drogas	Personas transgénero
Porcentaje (%) : Porcentaje de casos denunciados de violaciones de derechos humanos hacia personas que viven con el VIH y poblaciones clave que se han resuelto en los últimos 12 meses	30.9	17.4	33.3	63.6		20
Numerador : Número de casos denunciados de violaciones de derechos humanos hacia personas que viven con VIH y poblaciones clave que se han resuelto en los últimos 12 meses	29	4	15	7		3
Denominador : Número de casos de violaciones de derechos humanos hacia personas que viven con VIH y poblaciones clave informadas en los últimos 12 meses	94	23	45	11		15

Datos sub-nacionales

Introduzca el desglose por región abajo [añada las que sean necesarias]

Tipo de área	Nombre de área	Porcentaje - Todos	Porcentaje - Personas que viven con VIH	Porcentaje - Profesionales del sexo	Porcentaje - Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres	Porcentaje - Usuarios de drogas inyectables	Porcentaje - Personas transgénero
--------------	----------------	--------------------	---	-------------------------------------	---	---	-----------------------------------

5.1 Personas jóvenes: Conocimientos sobre la prevención del VIH

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

Respuestas correctas a las cinco preguntas

	15-24	Todos los hombres (15-24)	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Todas las mujeres (15-24)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)
Porcentaje (%) : Porcentaje de entrevistados de 15 a 24 años que respondió correctamente a las cinco preguntas							
Numerador : Número de entrevistados de 15 a 24 años que respondió correctamente a las cinco preguntas							
Denominador : Número total de entrevistados de 15 a 24 años							

Respuestas correctas a la pregunta 1: "¿Se puede reducir el riesgo de transmisión del VIH manteniendo relaciones sexuales con una única pareja no infectada que no tiene otras parejas?"

	15-24	Todos los hombres (15-24)	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Todas las mujeres (15-24)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)
Porcentaje (%) : Porcentaje de entrevistados que respondió correctamente a la pregunta 1							
Numerador : Numerador: número de entrevistados/población que respondió correctamente a la pregunta 1							
Denominador : Número total de entrevistados de 15 a 24 años							

Respuestas correctas a la pregunta 2: "¿Puede reducirse el riesgo de contraer el VIH usando preservativos cada vez que se mantienen relaciones sexuales?"

	15-24	Todos los hombres (15-24)	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Todas las mujeres (15-24)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)
Porcentaje (%) : Porcentaje de entrevistados que respondió correctamente a la pregunta 2							
Numerador : Número de entrevistados/población que respondió correctamente a la pregunta 2							
Denominador : Número total de entrevistados de 15 a 24 años							

Respuestas correctas a la pregunta 3: "¿Puede una persona de aspecto saludable tener el VIH?"

	15-24	Todos los hombres (15-24)	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Todas las mujeres (15-24)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)
Porcentaje (%) : Porcentaje de entrevistados que respondió correctamente a la pregunta 3							
Numerador : Número de entrevistados/población que respondió correctamente a la pregunta 3							
Denominador : Número total de entrevistados de 15 a 24 años							

Respuestas correctas a la pregunta 4: "¿Se puede contraer el VIH por picaduras de mosquito?" (u otra pregunta específica del país)

	15-24	Todos los hombres (15-24)	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Todas las mujeres (15-24)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)
Porcentaje (%) : Porcentaje de entrevistados que respondió correctamente a la pregunta 4							
Numerador : Número de entrevistados/población que respondió correctamente a la pregunta 4							
Denominador : Número total de entrevistados de 15 a 24 años							

Respuestas correctas a la pregunta 5: "Se puede contraer el VIH por compartir alimentos con una persona infectada?" (u otra pregunta específica del país)

	15-24	Todos los hombres (15-24)	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Todas las mujeres (15-24)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)
Porcentaje (%) : Porcentaje de entrevistados que respondió correctamente a la pregunta 5							
Numerador : Número de entrevistados/población que respondió correctamente a la pregunta 5							
Denominador : Número total de entrevistados de 15 a 24 años							

5.2 Demanda de planificación familiar satisfecha mediante métodos modernos

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todos (15-49)	15-19	20-24	25-49
Porcentaje (%) : Porcentaje de mujeres en edad reproductiva (de entre 15 y 49 años de edad) que han visto satisfechas sus demandas de servicios de planificación familiar con métodos modernos				
Numerador : Número de mujeres de entre 15 y 49 años de edad que utilizan métodos anticonceptivos modernos				
Denominador : Número total de mujeres de entre 15 y 49 años de edad que tienen una demanda para planificación familiar				

10.1 Terapia combinada de la infección por el VIH y la tuberculosis

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Registros sobre pacientes con tuberculosis

Otra herramienta/fuente de medición:: Sistema Operativo Epidemiológico para TB (SIOE)

Desde la fecha: 01/01/2017

Hasta la fecha: 31/12/2017

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

	Total	Hombres	Mujeres	<15	15+
Numerador : Número de pacientes de TB (nuevos y que recaen en la enfermedad) que son VIH-positivos que iniciaron el tratamiento para TB durante el periodo del que se informa que ya estaban recibiendo terapia antirretroviral o que empezaron terapia antirretroviral durante el tratamiento de TB dentro del año de reporte	424	261	163	23	401

Nota: la OMS calcula las estimaciones anuales del número de casos incidentes de tuberculosis en personas que viven con el VIH. Las estimaciones del denominador de 2017, facilitadas por los países sobre la notificación y la cobertura del tratamiento antirretroviral, solo están disponibles desde la segunda mitad del año de notificación y no es necesario incluirlas en el momento de presentar los informes. Las estimaciones de 2016 se pueden consultar en: <http://www.who.int/tb/country/data/download/en/>

Datos específicos de ciudades

Aporte información para la ciudad capital así como para una o dos ciudades más que sean clave por su alta relevancia epidemiológica

Ciudad	Numerador
--------	-----------

10.2 Personas que viven con el VIH con tuberculosis activa

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Registros de pacientes que reciben tratamiento antirretrovírico

Otra herramienta/fuente de medición:: Sistema Unico de Registro de los Servicios de Atención Integral (SURSAI-Ficha)

Desde la fecha: 01/01/2017

Hasta la fecha: 31/12/2017

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

	Valor de datos
Porcentaje (%) : Número total de personas seropositivas con tuberculosis activa, expresado como el porcentaje de los pacientes que se registran por primera vez en la atención para el VIH (terapia antirretrovírica o tratamiento previo) durante el periodo de notificación	4.9
Numerador : Número total de personas con tuberculosis activa durante el periodo de notificación entre quienes se registraron por primera vez en la atención para el VIH	114
Denominador : Número total de personas que se inscribieron por primera vez en la atención para el VIH durante el periodo de notificación (pre-terapia antirretroviral o terapia antirretroviral) El denominador debe ser el mismo que el denominador del indicador 10.3	5415

Datos específicos de ciudades

Aporte información para la ciudad capital así como para una o dos ciudades más que sean clave por su alta relevancia epidemiológica

Ciudad	Porcentaje	Numerador	Denominador
--------	------------	-----------	-------------

10.3 Personas que viven con el VIH que comenzaron la terapia preventiva contra la tuberculosis

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Registros de pacientes que reciben tratamiento antirretrovírico

Otra herramienta/fuente de medición:: Sistema Unico de Registro de los Servicios de Atención Integral (SURSAI-Ficha)

Desde la fecha: 01/01/2017

Hasta la fecha: 31/12/2017

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

¿Se dispone de nuevos datos sobre las personas NUEVAMENTE inscritas en la atención del VIH?: Sí

Recién matriculados en la atención del VIH

	Valor de datos
Porcentaje (%) : Número de pacientes que comenzaron el tratamiento para la infección por tuberculosis latente, expresado como el porcentaje del número total de personas que se registraron por primera vez en la atención para el VIH durante el periodo de notificación	25.5
Numerador : Número total de personas seropositivas que se registraron por primera vez en la atención para el VIH e iniciaron el tratamiento para la infección por tuberculosis latente durante el periodo de notificación	1381
Denominador : Número total de personas que se registraron por primera vez en la atención para el VIH, es decir, quienes comenzaron la terapia antirretrovírica o el tratamiento previo a esta durante el periodo de notificación El denominador debe ser el mismo que el denominador del indicador 10.2	5415

Si no se dispone de nuevos datos sobre las personas NUEVAMENTE inscritas en la atención del VIH, ¿tiene datos disponibles sobre las personas que actualmente están inscritas en la atención del VIH?:

Actualmente matriculado en la atención del VIH

	Valor de datos
Porcentaje (%) : Número de pacientes que iniciaron el tratamiento para la infección de tuberculosis latente, expresado como porcentaje del número total de pacientes actualmente inscritos en la atención del VIH durante el período de referencia.	
Numerador : Número total de personas que viven con el VIH actualmente inscritas en la atención del VIH y que inician el tratamiento de la infección latente por tuberculosis durante el período del informe	
Denominador : Número total de personas actualmente inscritas en la atención del VIH: es decir, inscritas para recibir terapia preantirretroviral o terapia antirretroviral durante el período que abarca el informe	

Datos específicos de ciudades

Aporte información para la ciudad capital así como para una o dos ciudades más que sean clave por su alta relevancia epidemiológica

Ciudad	Porcentaje (nuevamente matriculado en cuidados)	Numerador (nuevo inscrito en el programa de cuidado)	Denominador (nuevo inscrito en el programa de cuidado)	Porcentaje (actualmente matriculado en la atención)	Numerador (actualmente matriculado en el cuidado)	Denominador (actualmente matriculado en el cuidado)

10.4 Hombres con secreción uretral

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Notificación de casos nacional

Otra herramienta/fuente de medición:: Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE)

Desde la fecha: 01/01/2017

Hasta la fecha: 31/12/2017

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: Es importante resaltar que el sistema presenta un sub-registro de notificación.

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

¿Son los datos representativos de todo el país?: Sí

En caso negativo, indique la representatividad de los datos:

	Total
Porcentaje (%) : Porcentaje de hombres con secreción uretral en los últimos 12 meses	0.3
Numerador : Número de hombres con secreción uretral durante el periodo de notificación	10631
Denominador : Número de hombres con 15 o más años de edad	3605259

10.5 Gonorrea entre la población masculina

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

	Total
Índice : Índice de cuadros de gonorrea diagnosticados en laboratorio entre hombres de países que cuentan con capacidades de laboratorio para este tipo de diagnósticos	
Numerador : Número de hombres que reportan gonorrea diagnosticados en laboratorio en los anteriores 12 meses	
Denominador : Número de hombres de 15 años de edad o más	

10.6 Pruebas de hepatitis B

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

	Total	Hombres	Mujeres	<15	15+	Personas que se inyectan drogas
Porcentaje (%) : Proporción de personas que inician terapias antirretrovirales que se han sometido a pruebas para la detección de la hepatitis B						
Numerador : Número de personas que iniciaron terapias antirretrovirales que fueron sometidas a pruebas de hepatitis B durante el periodo del que se informa utilizando pruebas de antígeno de superficie de la hepatitis B						
Denominador : Número de personas que empiezan terapias antirretrovirales durante el periodo sobre el que se informa						

10.7 Personas coinfectadas con VIH y VHB que reciben tratamiento combinado

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:

	Total	Personas que se inyectan drogas
Porcentaje (%) : Proporción de personas coinfectadas con VIH y VHB que reciben terapia combinada		
Numerador : Número de personas coinfectadas con el VIH y el VHB que reciben tratamiento con medicamentos antirretrovirales eficaces contra tanto el VIH como el VHB durante el periodo del que se informa		
Denominador : Número de personas diagnosticadas con el VIH y el VHB que reciben atención para el VIH durante el periodo del que se informa (12 meses)		

10.8 Pruebas de hepatitis C

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

	Total	Hombres	Mujeres	<15	15+	Personas que se inyectan drogas
Porcentaje (%) : Proporción de personas que inician terapias antirretrovirales que se han sometido a pruebas para la detección del virus de la hepatitis C (VHC)						
Numerador : Número de adultos y niños que inician terapias antirretrovirales que fueron sometidas a pruebas para la hepatitis C durante el periodo del que se informa utilizando la secuencia de pruebas sobre anticuerpos anti-VHC seguidas de técnicas de reacción en cadena de la polimerasa a VHC para quienes sean anti-VHC-positivos						
Denominador : Número de adultos y niños que empiezan terapias antirretrovirales durante el periodo sobre el que se informa						

10.9 Personas coinfectadas con el VIH y el VHC que comienzan el tratamiento contra el VHC

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

	Total	Personas que se inyectan drogas
Porcentaje (%) : Proporción de personas diagnosticadas con coinfección por VIH/VHC que comenzaron el tratamiento para el VHC		
Numerador : Número de personas diagnosticadas con coinfección por el VIH y el VHC que iniciaron el tratamiento del VHC durante un periodo de tiempo determinado (por ejemplo, 12 meses)		
Denominador : Número de personas diagnosticadas con coinfección por el VIH y el VHC que recibieron atención para el VIH en un periodo de tiempo determinado (12 meses)		

10.10 Cáncer de cuello de útero entre las mujeres que viven con el VIH

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Mujeres que viven con el VIH que se reportan haber sido revisadas para el cáncer cervical

	30-49	Residencia: Urbana	Residencia: Rural
Porcentaje (%) : Proporción de mujeres que viven con el VIH de entre 30 y 49 años de edad que comunican haber sido sometidas a pruebas de detección de cáncer de cuello de útero utilizando alguno de los siguientes métodos médicos: inspección con ácido acético o vinagre (VIA, por sus siglas en inglés), citología vaginal o prueba sobre el virus del papiloma humano (VPH)			
Numerador : Número de mujeres que viven con el VIH de entre 30 y 49 años de edad que dan cuenta de haberse sometido a una prueba de detección del cáncer de cuello de útero en que se haya utilizado alguno de los siguientes métodos: VIA, citología vaginal o prueba para el VPH			
Denominador : Todas las mujeres encuestadas que viven con el VIH de entre 30 y 49 años de edad			

Mujeres que dieron positivo en la prueba del VIH entre las mujeres que fueron revisadas para el cáncer cervical

	30-49	Residencia: Urbana	Residencia: Rural
Porcentaje (%) : Proporción de mujeres que dieron positivo en la prueba del VIH entre todas las mujeres (entre 30 y 49 años de edad) que fueron revisadas para detectar cáncer cervical usando cualquiera de estos métodos: IVAA, Papanicolaou y prueba de VPH			
Numerador : Número de mujeres que dieron positivo en la prueba del VIH entre todas las mujeres (de 30 a 49 años de edad) que resultaron ser seropositivas a la prueba de detección del cáncer cervical			
Número de personas que se realizaron las pruebas : Número de mujeres que se sometieron a la prueba del VIH entre todas las mujeres (de 30 a 49 años de edad) que se sometieron a la prueba de detección del cáncer cervical			
Denominador : Todas las mujeres (de 30 a 49 años de edad) que fueron revisadas para detectar cáncer cervical usando cualquiera de estos métodos: IVAA, citología vaginal y prueba de Papanicolaou y VPH			

i Encabezado

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Especifique

Otra herramienta/fuente de medición:: Taller para llenar y analizar la información recolectada en el ICPN A por las instituciones gubernamentales.

Desde la fecha: 01/01/2017

Hasta la fecha: 31/12/2017

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Descargar este formato: [Cuestionario del ICPN \(PDF\)](#)

Describe el proceso utilizado para recopilar y validar los datos del ICPN:

ICPN - PARTE A [para que respondan los funcionarios gubernamentales]

Nombres	Correo electrónico	Organización	Cargo	Tipo de parte interesada	Comentarios
Casimira Guzman	casimiragm@gmail.com	DIGECOM		Ministerio de Salud	
Nuris Vargas	nurysvargas@hotmail.com	DIGECITSS	Asistente M&E	Ministerio de Salud	Programa Nacional de VIH
Oswaldo Lorenzo	oval99@gmail.com	DIGECITSS	Encargado de Vigilancia Epidemiologica	Ministerio de Salud	Programa Nacional de VIH
Hector Urraca	edwardourraca@gmail.com	Gabine de Políticas Sociales		Otros, especificar en Comentarios	Vice Presidencia
Edwin Ramirez	edwin.ramirez@sns.gob.do	Servicio Nacional de Salud	Director de Sistemas de Informacion y Aplicaciones	Otros, especificar en Comentarios	Atencion a las Personas
Jose Gonzalez Carpio	gonzalezcja43@hotmail.com	MIDE DCMYSM		Otros, especificar en Comentarios	Fuerzas Armadas
Engels Guzman	eguzman@conavihsida.gob.do	CONAVIHSIDA	Coordinador de Poblaciones Clave	Ministerio de Salud	Respesta Nacional
Emly Ramirez	emely.ramirez@pgr.gob.do	Procuraduria General de la Republica		Otros, especificar en Comentarios	Procuraduria
Rosa Sanchez	rsanchez@conavihsida.gob.do	CONAVIHSIDA	Coordinadora de M&E y Sistema de Información	Ministerio de Salud	Respuesta Nacional
Idavelga Ciriaco	iciriaco@juventud.gob.do	Ministerio de Juventud	Encargada de Planificación	Otro ministerio	Juventud
Tessie Caballero	tesie.caballero@ministeriodesalud.gob.do	DIGECITSS	Encargada de M&E	Ministerio de Salud	Programa Nacional de VIH
Marisol Jimenez	marisol.jimenez@ministeriodesalud.gob.do	DIGECITSS	Encargada de Atención Integral	Ministerio de Salud	Programa Nacional de VIH
Marisol Peguero	marisol.peguero@ministeriodesalud.gob.do	DIGEPI	Coordinadora de Vigilancia Epidemiologica	Ministerio de Salud	Epidemiologia

A.1 Garantizar que 30 millones de personas que viven con el VIH tengan acceso a tratamiento cumpliendo con los objetivos 90-90-90 para el año 2020

1. ¿Cuál o cuáles de los siguientes enfoques en cuanto a pruebas sobre VIH se utilizan en su país? (Seleccione todas las opciones que correspondan): Pruebas y asesoramiento iniciados por el cliente, Pruebas y asesoramiento iniciados por el proveedor, Pruebas prenatales rutinarias, Pruebas y asesoramiento de base comunitaria

2. ¿Ha adaptado su país las recomendaciones de las Directrices consolidadas de la OMS 2015 sobre los servicios de pruebas sobre VIH en un procedimiento nacional sobre directrices para este tipo de pruebas?: Sí, parcialmente

3. ¿Ha adoptado o incluido su país pruebas autodiagnósticas de VIH como política o plan nacional?: No

3.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿están implementadas las pruebas autodiagnósticas sobre VIH?:

3.2 Si la respuesta es negativa, ¿tiene su país planes para incluir esas pruebas autodiagnósticas en su política de actuación nacional en el futuro?: No

3.2.a Si la respuesta es afirmativa, indíquese el año en que está planificado que se incluyan las pruebas autodiagnósticas::

4. ¿Ha incluido su país la notificación asistida a parejas en su política nacional?: No

4.1 Si la respuesta es negativa, ¿tiene su país planes para incluir la notificación asistida a parejas en su política nacional en el futuro?: No

4.1.a Si la respuesta es afirmativa, indíquese el año en que está planificado que se incluya esa notificación asistida a parejas::

5. ¿Cuenta su país con una política de actuación que establezca que las pruebas sobre el VIH se facilitarán:: De forma gratuita para todos

6. ¿Existe alguna ley, regulación o política que establezca que las pruebas de VIH?

a) Se realizan únicamente sobre la base del consentimiento informado y voluntario: Sí

b) Son obligatorias antes del matrimonio: No

c) Son obligatorias para obtener un permiso de trabajo o de residencia: Sí

d) Son obligatorias para ciertos grupos: Sí

d.i. Si la respuesta es afirmativa, especifíquese esos grupos: Donantes biológicos, personas en procesos penales y embarazadas.

7. ¿Cuenta su país con políticas y/o estrategias nacionales sobre la vinculación de pruebas y asesoramiento sobre VIH e inclusión en servicios de atención sanitaria?: Sí

7.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿incluyen (seleccionar todas las opciones que correspondan): Intervenciones racionalizadas (vinculación potenciada, revelación, rastreamiento)?, Enfoques basados en apoyo de pares y navegación para pacientes?, Pruebas de CD4 en puntos de atención sanitaria?

Si son otros, especifique:

Terapia antirretroviral

8. ¿Ha adaptado su país las recomendaciones de las Directrices consolidadas de la OMS 2016 sobre uso de medicamentos antirretrovirales para el tratamiento y la prevención de la infección por VIH en un procedimiento nacional?: En curso

Si es de otra manera, descríbala:

Favor cargar una copia de directrices nacionales actualizadas que estén disponibles.

9. ¿Cuál es el umbral recomendado de CD4 para iniciar terapias antirretrovirales en adultos y adolescentes que sean asintomáticos, de conformidad con las directrices o directivas del Ministerio de Salud?: ≤ 500 células/mm³

De ser otra, sírvase indicarla:

9.1 ¿Cuál es la situación de implementación del umbral de CD4 seleccionado más arriba?: Implementado en todo el país

De ser otra, sírvase indicarla:

9.2 Si su país no ha adoptado todavía una política de TRATAMIENTO UNIVERSAL, de conformidad con las Directrices consolidadas de la OMS 2016 sobre uso de medicamentos antirretrovirales para el tratamiento y la prevención de la infección por VIH, ¿existe un plan para avanzar hacia la adopción e implementación de una política de TRATAMIENTO UNIVERSAL en el futuro?: Sí

9.2a Si la respuesta es afirmativa, indíquese el año en que está previsto que se implemente el TRATAMIENTO UNIVERSAL?: 2019

10. ¿Cuenta su país con una política nacional que promueve la entrega comunitaria de terapia antiretroviral (como instalaciones de salud externas)?: No

10.1 Si la respuesta es afirmativa, especificar qué enfoques se siguen para comunitaria de terapia antirretroviral:

11. ¿Se provee en su país terapia antirretroviral en entornos comunitarios (como afuera de instalaciones de salud) para las personas que se hallan estables en su terapia antirretroviral?: No

11.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿está implementada?:

De ser otra, sírvase indicarla:

12. ¿Tiene su país una política nacional sobre el nivel de frecuencia con que las personas que tienen una situación estable en su terapia antirretroviral deberán recoger medicamentos antirretrovirales?: Sí

12.1 Si la respuesta es afirmativa, especifique la frecuencia de las recogidas de medicamentos antirretrovirales incluida en la política nacional:: Cada 3 meses

13. ¿Cuál o cuáles de las siguientes modalidades de provisión de servicios se incluyen en la política nacional sobre terapia antirretroviral para adultos, adolescentes y niños? (Seleccione todas las opciones que correspondan): Los proveedores de servicios para madres, recién nacidos y niños ofrecen terapia antirretroviral en centros sanitarios de atención para madres, recién nacidos y niños, Servicios de asesoramiento y apoyo nutricional provistos para personas que viven con el VIH que presentan cuadros de malnutrición, Apoyo para el paciente

De ser otra, sírvase indicarla:

Regímenes de terapia antirretroviral

Adultos y adolescentes

14. ¿Son TDF/3TC o (FTC)/EFV las combinaciones de antirretrovirales de primera línea de preferencia en las directrices nacionales para la iniciación de tratamientos entre...?

a) Adultos y adolescentes: Sí

b) Mujeres embarazadas: Sí

De ser otra, sírvase indicarla:

15. ¿Se está introduciendo el dolutegravir (DTG) como el régimen ARV de primera línea en su país?: Sí, la introducción de DTG en las directrices nacionales está prevista para 2018.

16. ¿Utiliza su país combinaciones de terapia antirretroviral combinada con dosis fijas (FDC, en inglés) como la terapia antirretroviral de primera línea de preferencia? (Seleccione todas las opciones que correspondan): Sí, combinación de dosis fija de 2 medicamentos + 1 medicamento diferente

De ser otra, sírvase indicarla:

17. ¿Es AZT/3TC (o FTC)/ATV/r (o LPV/r) la combinación de antirretrovirales de segunda línea de preferencia para adultos y adolescentes que viven con el VIH en las directrices nacionales?: Sí

De ser otra, sírvase indicarla:

Carga viral

18. ¿Tiene su país una actual política nacional sobre pruebas de de carga viral de rutina para la vigilancia la terapia antirretroviral y en qué medida está implementada esa política?

a) Para adultos y adolescentes: Sí, plenamente implementada

b) Para niños: Sí, plenamente implementada

18.1 Si su país tiene una política nacional sobre pruebas de carga viral de rutina, ¿cuál es la frecuencia que se recomienda en esa política para las pruebas sobre supresión de carga viral?: Otro

De ser otra, sírvase indicarla: Cada 6 meses

19. ¿En qué lugares están disponibles actualmente en su país pruebas de carga viral?: Están disponibles en centros especializados únicamente

De ser otra, sírvase indicarla:

19.1 Si en las instalaciones sanitarias que ofrecen terapia antirretroviral de su país están disponibles pruebas de carga viral, favor estimar el porcentaje de esas instalaciones que tienen disponibles pruebas de carga viral:

20. Excluyendo enfoques de farmacovigilancia pasiva, ¿realiza su país esfuerzos sistemáticos continuados para supervisar en el país la toxicidad de medicamentos antirretrovirales?: No

20.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿qué enfoques se utilizan? (seleccionar todas las opciones que correspondan)::

21. ¿Se han introducido enfoques de vigilancia de la toxicidad para vigilar las reacciones adversas a los medicamentos por el uso de dolutegravir?: No

21.1 En caso afirmativo, ¿qué enfoques se utilizan?:

A.2 Eliminar nuevas infecciones infantiles de VIH para el año 2020 a la vez que se garantiza que 1,6 millones de niños tengan acceso a tratamiento para el VIH para el año 2018

Prevención de la transmisión maternoinfantil del VIH

22. ¿Cuál es el régimen actual que se recomienda nacionalmente para la prevención de la transmisión maternoinfantil del VIH de conformidad con las directrices o directivas del Ministerio de Salud?: Tratamiento Universal para las mujeres embarazadas / mujeres lactantes para toda la vida

Otro, especificar régimen::

22.1 Si su país está aplicando la política de TRATAMIENTO UNIVERSAL para mujeres embarazadas y en periodo de lactancia que viven con el VIH, ¿de qué forma se está implementando?: Implementado en todo el país

Participación comunitaria en la prevención de la transmisión maternoinfantil del VIH

23. ¿Cuántas instalaciones sanitarias de su país están proveyendo servicios para la prevención de la transmisión maternoinfantil (PTMI) en el país?: 144

23.1 ¿Cuántas instalaciones sanitarias que proveen servicios PTMI tienen en vigor mecanismos de rendición de cuentas comunitaria?: 0

24. ¿Existen intervenciones dirigidas para garantizar que las siguientes consideraciones relativas a los derechos humanos reciben respuesta como parte de programas sobre PTMI? (Seleccione todas las opciones que correspondan): Consentimiento libre e informado como única base para las pruebas y/o tratamiento para el VIH,Confidencialidad y privacidad

25. ¿Ha tenido lugar alguna reunión a nivel nacional para revisar los avances en PTMI en los últimos doce meses?: No

25.1 Si la respuesta es afirmativa::

a) ¿Estuvieron representadas las comunidades y la sociedad civil en esa reunión de revisión nacional?:

b) ¿Se dio la oportunidad a las comunidades y a la sociedad civil de ofrecer sus comentarios?:

c) ¿La comunidad y la sociedad civil aportaron análisis de forma sistemática?:

d) ¿Esos análisis provistos por las comunidades y la sociedad civil se documentó y difundió tras esa reunión?:

e) ¿Participan* las mujeres que viven con el VIH en su país en el desarrollo de políticas, directrices y estrategias relativas a PTMI?:

Antirretrovirales para niños

26. ¿Recomiendan las directrices nacionales el tratamiento para todos los bebés y niños que viven con el VIH independientemente de los síntomas que presenten?: Sí, con una edad de corte para el tratamiento universal de <5 años

Otro, especificar:

26.1. ¿Cuál es en su país la situación de implementación de la política sobre edad de corte?: Implementado en todo el país

Otro, especificar:

A.3 Garantizar el acceso a opciones de prevención combinada, entre ellas profilaxis previa a la exposición, circuncisión masculina médica voluntaria, reducción de daños, y preservativos, para como mínimo el 90% de las personas de aquí a 2020, especialmente mujeres jóvenes y niñas adolescentes en países con alta prevalencia y grupos de población clave (los hombres gay y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, las personas transgénero, los profesionales del sexo y sus clientes, las personas que consumen drogas inyectables y los presos)

Profilaxis previa a la exposición (PrEP)

27. ¿Se ha adoptado la recomendación de la OMS sobre la PrEP oral en las directrices nacionales de su país?: No, no se han elaborado directrices

27.1 Si la recomendación de la OMS sobre la PrEP oral aún no se ha adoptado en las directrices nacionales, ¿existe un plan para adoptar una recomendación de PrEP en el futuro?: Sí

27.1a En caso afirmativo, sírvase indicar el año en que está previsto adoptar las recomendaciones de la PrEP:: 2020

Otro, especificar:

27.2 Si se han elaborado directrices nacionales de PrEP, sírvase especificar para qué poblaciones se proporciona la PrEP según las directrices y los criterios de elegibilidad

aplicados para ofrecer la PrEP:

Hombres gay y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres:

Especificar los criterios de elegibilidad:

Profesionales del sexo:

Especificar los criterios de elegibilidad:

Personas que usan drogas inyectables:

Especificar los criterios de elegibilidad:

Personas transgénero:

Especificar los criterios de elegibilidad:

Parejas serodiscordantes:

Especificar los criterios de elegibilidad:

Mujeres jóvenes (de edades 15-24 años):

Especificar los criterios de elegibilidad:

Otros:

Otros: especificar:

Especificar los criterios de elegibilidad:

27.3 Si se han elaborado directrices nacionales de PrEP, ¿se ha impartido un programa de capacitación sobre PrEP al personal de atención de la salud?:

27.4 Si no se han elaborado las directrices nacionales de PrEP, seleccione las razones pertinentes (sírvase seleccionar todas las que correspondan):: Otro

28. ¿Ha recibido un régimen que contenga tenofovir para la PrEP una aprobación regulatoria en su país? (Seleccione todo lo que corresponda): No

29. Está disponible la PrEP a través de cualquiera de las siguientes opciones en su país (sírvase seleccionar todas las que correspondan):: Proveedores privados

Otros: especificar:

Preservativos

30. ¿Ha habido situaciones de desabastecimiento* de preservativos en los últimos 12 meses?

a) Situaciones de desabastecimiento de alcance nacional: Sí

b) Situaciones de desabastecimiento de alcance local: Sí

31. ¿Cuántos preservativos y lubricantes se distribuyeron (es decir, salieron de almacenes centrales o regionales para su subsiguiente distribución) en el anterior año calendario, según tipo de proveedor?

a) Preservativos masculinos

	Valor de datos
Total	3213216
Público	
Privado	
ONG	3213216

b) Preservativos femeninos

	Valor de datos
Total	128200
Público	0
Privado	0
ONG	128200

c) Lubricantes

	Valor de datos
Total	653760
Público	0
Privado	0
ONG	653760

A.4 Eliminar las desigualdades de género y acabar con todas las formas de violencia y discriminación contra las mujeres y las niñas, las personas que viven con el VIH y los grupos de población clave, para el año 2020

32. ¿Tiene su país legislación que exija el consentimiento parental para que los/las adolescentes puedan acceder a servicios de salud sexual y reproductiva?: No

33. ¿Tiene su país legislación que exija el consentimiento parental para que los/las adolescentes puedan acceder a pruebas sobre el VIH?: Sí, para adolescentes menores de 16 años

34. ¿Tiene su país legislación que exija el consentimiento parental para que los/las adolescentes puedan acceder a tratamiento para el VIH?: No

35. ¿Tiene su país legislación que exija el consentimiento del cónyuge para que las mujeres casadas puedan acceder a servicios de salud sexual y reproductiva?: No

36. ¿Tiene su país legislación que exija el consentimiento del cónyuge para que las mujeres casadas puedan acceder a la prueba de VIH?: No

A.6 Garantizar que el 75% de las personas que viven con el VIH o que estén en situación de riesgo o que se vean afectadas por el VIH se beneficien de protección social sensible ante el VIH para el año 2020

37. ¿Tiene su país estrategias, políticas o marcos de trabajo de protección social aprobados?: Sí, y están siendo implementados

37.1 Si la respuesta es afirmativa

a) ¿Hace referencia al VIH?: Sí

b) ¿Reconoce a las personas que viven con el VIH como beneficiarios clave?: Sí

c) ¿Reconoce a grupos de población clave (profesionales del sexo, hombres gay y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, personas que usan drogas inyectables, personas transgénero y presos) como beneficiarios clave?: No

d) ¿Reconoce a las adolescentes y mujeres jóvenes como beneficiarias clave?: Sí

e) ¿Reconocen a las personas afectadas por el VIH (niños y familiares) como beneficiarios clave?: Sí

f) ¿Aborda la cuestión del trabajo de cuidado no remunerado en el contexto del VIH?: No

38. ¿Están incluidos representantes del Programa Nacional sobre sida o de su equivalente en el mecanismo o plataforma de coordinación de protección social?: Existe un mecanismo o plataforma de coordinación de la protección social e incluye a representantes del Programa Nacional sobre el Sida o de su equivalente

39. ¿Hay implementados en el país programas de transferencias de efectivo para mujeres jóvenes, de entre 15 y 24 años de edad?: Sí

A.7 Garantizar que como mínimo el 30% de todas las actuaciones de prestación de servicios estén dirigidas por la comunidad para el año 2020

40. ¿Existen en su país las siguientes salvaguardas en la legislación, regulaciones y políticas para la operación de organizaciones de la sociedad civil y organizaciones comunitarias? (Seleccione todas las opciones que correspondan): Es posible el registro de organizaciones de la sociedad civil que trabajen con el VIH, Es posible el registro de organizaciones de la sociedad civil y organizaciones comunitarias que trabajen con grupos de población clave, Las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones comunitarias pueden prestar servicios sobre el VIH, Las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones comunitarias pueden prestar servicios sobre el VIH para grupos de población clave, Se han racionalizado los requisitos sobre la presentación de información para las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones comunitarias

41. ¿Existe legislación, políticas o regulaciones que permitan el acceso a financiación para las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones comunitarias?: A través de donantes internacionales

Otro, especificar:

A.10 Compromiso para sacar el Sida del aislamiento a través de sistemas centrados en las personas para mejorar la cobertura sanitaria universal, lo que incluye el tratamiento de la tuberculosis, el cáncer de cuello de útero y la hepatitis B y C

Estrategia nacional sobre VIH y monitoreo y evaluación

Estrategia

42. ¿Cuenta su país con una estrategia o política que oriente su respuesta al Sida?: Sí, una estrategia o política independiente sobre el Sida

Otro, especificar:

42.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿ha sido revisada en los dos últimos años esa estrategia o política sobre el Sida?: Sí

42.2 Si la respuesta es afirmativa, ¿esa estrategia o política que orienta la respuesta al sida aborda de forma expresa los siguientes grupos de población clave o grupos de población vulnerable? (Seleccione todas las opciones que correspondan): Grupos clave de población adolescente, Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, Presos y otras personas privadas de libertad, Profesionales del sexo (hombres y mujeres), Personas transgénero, Personas no desplazadas afectadas por emergencias, Desplazados internos, Migrantes y solicitantes de asilo

42.3 Si la respuesta es afirmativa, ¿esa estrategia o política que orienta la respuesta al Sida...? (Seleccione todas las opciones que correspondan): Incluye de forma específica planes o actividades explícitos que abordan las necesidades de los grupos de población clave, Incluye de forma específica planes o actividades explícitos que abordan las necesidades de las niñas y mujeres jóvenes, Se basa en la evidencia más reciente sobre la epidemia nacional de VIH y en la situación de la respuesta nacional frente al Sida, Integra aportaciones a través de un proceso multisectorial, que incluye a diversos sectores del gobierno, y también a socios no gubernamentales

42.4 Si la respuesta es afirmativa, ¿esa estrategia o política nacional que orienta la respuesta al sida incluye intervenciones transformadoras en materia de género, entre ellas intervenciones dirigidas a abordar las intersecciones que se producen entre violencia de género y VIH?: Sí

42.4a Si la respuesta es afirmativa, ¿esa estrategia o política nacional que orienta la respuesta frente al Sida incluye secciones presupuestarias dedicadas a la implementación de intervenciones transformadoras en materia de género*?: Sí

Monitoreo y evaluación

Sistemas de Información en Salud

43. ¿Cuenta su país con un sistema de información sobre la salud que funcione bien y sea electrónico, en papel o ambos?: Sí, ambos

43.1 En caso afirmativo, ¿qué porcentaje de lo siguiente se recoge actualmente en los informes del sistema electrónico nacional de información sanitaria?

	Valor de datos
Centros de salud que prestan servicios relacionados con el VIH	100
Cohorte nacional de tratamiento del VIH (es decir, todos los pacientes que reciben terapia antirretroviral)	100

Prevalencia ANC de rutina

44. ¿Está utilizando el país los datos de los asistentes a las clínicas prenatales sobre el número de mujeres que dan positivo en las pruebas del VIH y el número de mujeres que ya se sabe que son VIH-positivas para comprender las tendencias de la prevalencia del VIH?: No

44.1 En caso afirmativo, ¿se ha llevado a cabo una revisión de la calidad de estos datos en los últimos dos años para garantizar su comparabilidad en el tiempo?:

44.2 Si la respuesta es "Sí" a 43 y 47, ¿se capturan estos datos en su sistema de información de salud (DHIS2 u otros)?: Sí

Tratamiento cascada

45. Si la respuesta es "Sí" a 43, ¿están los resultados de las pruebas de carga viral a nivel del paciente disponibles rutinariamente en el sistema de información de salud?: Sí, plenamente

46. Están disponibles y analizados los datos de las cascadas de tratamiento:

	Pruebas	Tratamiento	Carga viral
¿A nivel de distrito?	No	No	No
¿Para las poblaciones clave?	No	No	No

47. ¿Se incluyen sistemáticamente los datos de las cascadas de tratamiento en el sistema de información sanitaria (DHIS2 u otros) con un cuadro de mando a nivel de distrito?: No

Sistemas de monitorización de pacientes

48. ¿Ha actualizado el país los indicadores y herramientas del sistema de seguimiento de pacientes utilizando las directrices de la OMS para el seguimiento de pacientes con VIH centrado en la persona y la vigilancia de casos?: Sí, parcialmente

Códigos de identificación únicos para pacientes

49. ¿Dispone el país de un método para identificar y eliminar la información médica duplicada de los pacientes dentro de las clínicas y entre ellas (como vincular registros utilizando identificadores únicos y/o información personal identificable (incluyendo datos biométricos) para los siguientes servicios?

- a) para los servicios de tratamiento: Sí
- b) para los servicios de tratamiento y pruebas: No
- c) para los servicios de prevención del VIH: No
- d) servicios de laboratorio: No

50. Si la respuesta es "Sí" a 49 a o b

- a) Los datos se enlazan utilizando un identificador nacional único de persona (NUPI) como un número nacional de identificación, un número nacional de asistencia sanitaria, un número de pasaporte o un número de seguridad social: Sí
- b) Los datos se vinculan mediante un identificador único específico del VIH: Sí
- c) Los datos se enlazan mediante una combinación de información de identificación personal recopilada de manera rutinaria, como el nombre, apellidos y fecha de nacimiento: Sí
- d) Los datos se vinculan mediante un sistema biométrico (por ejemplo, huellas dactilares, escaneado ocular): No
- e) Otros métodos para vincular la información del paciente. Por favor, especifique:

Reporte de casos

51. ¿Es el VIH una condición de notificación nacional por ley?: Sí

51.1 En caso afirmativo a 51, ¿existe un formulario estándar de notificación de casos de VIH para reportar nuevos casos diagnosticados?: Sí

51.2 Si la respuesta es afirmativa a 51, ¿se informa al país de que los sucesos centinela posteriores para los casos de VIH diagnosticados -como la fecha y el resultado del primer recuento de células CD4, la fecha de inicio del tratamiento antirretroviral y las fechas y los resultados de las primeras pruebas de carga viral y de seguimiento?: No

51.3 En caso afirmativo a 43 y 51, ¿se incluye la vigilancia basada en casos en el sistema de información sanitaria?: No

Mortalidad

52. ¿El país ordena que todas las muertes sean reportadas al sistema de registro civil y estadísticas vitales utilizando un formulario estándar de informe de defunción que incluya la causa de muerte?: Sí

52.1 En caso afirmativo, ¿qué tan completa es la notificación de la muerte al registro civil y al sistema de estadísticas vitales?: 51-75% completo

52.2 Si la respuesta es "Sí" a 51 y 52, ¿pueden ser los datos a nivel individual sobre las muertes notificadas?

a) vinculado al sistema nacional de notificación de casos de VIH del país?: Sí

b) informaron directamente al sistema nacional de notificación de casos de VIH del país?: Sí

0 Encabezado

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Encuesta sobre el uso de ARV

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha: 01/01/2017

Hasta la fecha: 31/12/2017

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Nombre de persona que rellenó el cuestionario: Tessie Caballero

Cargo: Encargada de Monitoreo y Evaluación

Institución: Dirección General de Control de Infecciones de Transmisión Sexual y SIDA (DIGECITSS)

Dirección de correo electrónico: tessie.caballero@ministeriodesalud.gob.do

Teléfono: 809-883-1535

1A Visión general del tratamiento antirretroviral (extraída de GAM 1.2, no es necesario rellenarla)

1B Tratamiento antirretroviral (tar) de adultos y adolescentes (≥ 10 años) VIH positivos, incluyendo embarazadas

Pregunta 1. Informe sobre el número de pacientes adultos y adolescentes (≥ 10 años) VIH positivos que recibían tratamiento de primera, segunda o tercera línea a fines de diciembre del 2017

	Número total de adultos y adolescentes (≥ 10 años) VIH positivos por línea de tratamiento a fines de diciembre del 2018
Primera línea	27503
Segunda línea	6965
Tercera línea	146
TOTAL	34614

Pregunta 2 Por favor liste el numero de personas en cada esquema de tratamiento antirretroviral de primera línea administrado a adultos y adolescentes ≥ 10 años VIH positivos a fines del 2017, incluyendo embarazadas VIH positivas que reciben TAR.

Por favor, comenzar por los esquemas administrados al mayor número de personas a fines del 2017.

Lista de esquemas de TAR de 1a línea administrados a adultos y adolescentes ≥ 10 años VIH positivos a fines del 2017	Número de adultos y adolescentes ≥ 10 años VIH positivos que recibieron este esquema de TAR a fines del 2017
---	---

TOTAL

	Valor de datos
TOTAL	

Pregunta 3 Por favor liste el numero de personas en cada esquema de tratamiento antirretroviral de segunda línea administrado a adultos y adolescentes ≥ 10 años VIH positivos a fines del 2017.

Por favor, comenzar por los esquemas administrados al mayor número de personas a fines del 2017.

Lista de Esquemas de TAR de 2a línea administrados a adultos y adolescentes ≥ 10 años VIH positivos a fines del 2017	Número de adultos y adolescentes ≥ 10 años VIH positivos que recibieron este esquema a fines del 2017
---	--

TOTAL

	Valor de datos
TOTAL	

Pregunta 4 Por favor liste el numero de personas en cada esquema de tratamiento antirretroviral de 3a línea administrado a adultos y adolescentes ≥ 10 años VIH positivos a fines del 2017.

Por favor, comenzar por los esquemas administrados al mayor número de personas a fines del 2017

Lista de esquemas de TAR de 3.a línea administrados adultos y adolescentes ≥ 10 años VIH positivos a fines del 2017	Número de adultos y adolescentes ≥ 10 años VIH positivos que recibieron este esquema a fines del 2017
--	--

TOTAL

	Valor de datos
TOTAL	

2 Tratamiento de niños vih positivos (<10 años)

Pregunta 5. Número de niños VIH positivos menores de 10 años por línea de tratamiento antirretrovirales a fines del 2017

	Número total de niños <10 años VIH positivos que recibían este esquema a fines de 2018
Primera línea	278
Segunda línea	107
Tercera línea	8
TOTAL	393

Pregunta 6. Por favor liste el numero de personas en cada esquema de tratamiento antirretroviral de 1.a línea administrado a niños <10 años a fines del 2017.

Por favor, comenzar por los esquemas administrados al mayor número de personas a fines del 2017.

Lista de esquemas de TAR de 1.a línea administrados a niños VIH positivos a fines del 2017	Número de niños < 3 años que recibían este esquema (A)	Número de niños ≥3 a <10 años que recibían este esquema (B)	Número de niños <10 años que recibían este esquema (A) + (B)
--	--	---	--

TOTAL

	Número de niños < 3 años que recibían este esquema a fines del 2015 (A)	Número de niños ≥3 a <10 años que recibían este esquema a fines del 2015 (B)	Número de niños <10 años que recibían este esquema a fines del 2015 (A) + (B)
TOTAL			

Pregunta 7. Por favor liste el numero de personas en cada esquema de tratamiento antirretroviral de segunda línea administrado a niños VIH positivos menores de 10 años a fines del 2017.

Por favor, comenzar por los esquemas administrados al mayor número de personas a fines del 2017.

Lista de esquemas de TAR de 2.a línea administrados a niños VIH positivos menores de 10 años a fines del 2017.	Número de niños VIH positivos <10 años que recibían este esquema a fines del 2017
--	---

TOTAL

	Valor de datos
TOTAL	

Pregunta 8 Por favor liste el numero de personas en cada esquema de tratamiento antirretroviral de tercera línea administrado a niños VIH positivos menores de 10 años a fines del 2017.

Por favor, comenzar por los esquemas administrados al mayor número de personas a fines del 2017.

Lista de esquemas de TAR de tercera línea administrados a niños VIH positivos < 10 años	Número de niños VIH positivos <10 años que recibían este esquema a fines del 2017
---	---

TOTAL

	Valor de datos
TOTAL	

3 Prevención de la transmisión maternoinfantil

Pregunta 9: Número y porcentaje (%) de embarazadas que iniciaron tratamiento antirretroviral para reducir el riesgo de transmisión maternoinfantil y otras opciones de PTMI durante el 2017 {GAM 2.3}

Pregunta 10: ¿Cuál es la opción de PTMI recomendada en su país para embarazadas VIH positivas :: Opción B+ (o "TREAT ALL")

Si Otra opción de PTMI utilizada en su país, especifique:

Pregunta 11. Por favor liste el numero de mujeres embarazadas en cada esquema de tratamiento con antirretrovirales utilizados en su país para la OPCIÓN A de PTMI en el 2017.

Por favor, comenzar por los esquemas administrados al mayor número de personas a fines del 2017

Esquemas de PTMI de la OPCIÓN A utilizados para embarazadas VIH positivas en el 2017	Número de embarazadas VIH positivas que iniciaron este esquema en el 2017
--	---

TOTAL

	Valor de datos
TOTAL	

Pregunta 12. Por favor liste el numero de mujeres embarazadas en cada esquema de tratamiento con antirretrovirales utilizados en su país para la OPCIÓN B de PTMI en el 2017.

Por favor, comenzar por los esquemas administrados al mayor número de personas a fines del 2017

Esquemas de TAR usados para la OPCIÓN B en embarazadas VIH positivas	Número de embarazadas VIH positivas que iniciaron este esquema en el 2017
--	---

TOTAL

	Valor de datos
TOTAL	

Pregunta 13. Por favor liste el numero de mujeres embarazadas en cada esquema de tratamiento con antirretrovirales utilizados en su país para la OPCIÓN B+ de PTMI en el 2017.

Por favor, comenzar por los esquemas administrados al mayor número de personas a fines del 2017.

Esquemas de TAR usados para OPCIÓN B+ en embarazadas VIH positivas	Número de embarazadas con VIH positivas que iniciaron este esquema en el 2017
1. TDF/3TC/EFV	375
2. AZT/3TC/NVP	50
3. AZT/3TC/LOP/RIT	49
4. AZT/F/3TC/EFV	34
5. Otros esquemas	303

TOTAL

	Valor de datos
TOTAL	811

Pregunta 14. Por favor liste el numero de neonatos por cada ARV utilizado en su país para la profilaxis del VIH en neonatos nacidos de mujeres VIH positivas en el 2017.

Antirretrovirales utilizados para la profilaxis en neonatos nacidos de mujeres VIH positivas ARV en 2017	Número de neonatos que recibieron este esquema en el 2017
Zidovudina	947

TOTAL

	Valor de datos
TOTAL	947

4 Servicios de laboratorio

PRUEBAS DE VIH

	Valor de datos
Pregunta 15. Número total de pruebas de VIH (pruebas rápidas y ELISA) realizadas entre enero y diciembre del 2017: : (Número de personas a las que se realizó la prueba del VIH: Ver GAM 1.1)	

PRUEBAS DE CD4

	Valor de datos
Pregunta 16. Número total de pruebas de CD4 realizadas entre enero y diciembre del 2017:	41024
Pregunta 17. Número de personas VIH positivas a las que se les realizó al menos una prueba de CD4 entre enero y diciembre del 2017:	40918
Pregunta 18. Número de pacientes en TAR a los que se les realizó al menos una prueba de CD4 entre enero y diciembre del 2017:	18067
Pregunta 19. Número de embarazadas VIH positivas a las que se les realizó al menos una prueba de CD4 entre enero y diciembre del 2017:	702

CARGA VIRAL

	Valor de datos
Pregunta 20. Número total de pruebas de carga viral realizadas entre enero y diciembre del 2017:	42273
Pregunta 21. Número de personas VIH positivas a las que se les realizó al menos una prueba de carga viral entre enero y diciembre del 2017:	40918
Pregunta 22. Número de pacientes en TAR a los que se les realizó al menos una prueba de carga viral entre enero y diciembre del 2017:	18067
Pregunta 23. Número de embarazadas VIH positivas a las que se les realizó al menos una prueba de carga viral entre enero y diciembre del 2017:	702

DIAGNÓSTICO TEMPRANO EN NIÑOS MENORES DE 12 MESES

	Valor de datos
Pregunta 24. Número total de pruebas de diagnóstico temprano realizadas entre enero y diciembre del 2017:	1154
Pregunta 25. Número de niños (<12 meses) nacidos de madres VIH positivas a quienes se les realizó una prueba de diagnóstico temprano entre enero y diciembre del 2017:	

Pregunta 26: Número total de laboratorios o establecimientos de salud y tipo de pruebas

Tipo de pruebas de laboratorio

	Número de laboratorios o establecimientos de salud donde se recogen muestras	Número de laboratorios o establecimientos de salud en los que se realiza esta prueba	Número de laboratorios o establecimientos de salud en los que se realiza esta prueba y que participan en un programa de evaluación externa de la calidad	Número de laboratorios o establecimientos de salud que requieren actividades de mejora de la calidad en base al ejercicio de evaluación externa de la calidad	Enumere las principales actividades necesarias para mejorar la calidad
Prueba serológica de anticuerpos anti-VIH incluida la prueba rápida	1070	1070	88	6	1.- Algoritmo de pruebas 2.- Documentación
Diagnóstico temprano en niños (menores de 12 meses) (EID)		1	1	0	
CD4	72	2	2	0	
Carga viral	72	2	2	0	
Pruebas de genotipificación y farmacoresistencia del VIH	De acuerdo la necesidad identificada en los 72 servicios de Atención al VIH a nivel nacional		1	1	0
GeneXpert (prueba de tuberculosis)			8		

Pregunta 27: Disponibilidad de tecnologías de laboratorio para el VIH: por favor, enumerar tantas tecnologías como posea su país a fines del 2017. Elimine aquellas que su país no posea.

Tecnologías para pruebas de CD4

	Número de equipos de laboratorio	Número de laboratorios o establecimientos de salud donde están instalados los equipos de laboratorio	Número total de equipos que no están en uso	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Sin reactivos	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Sin instalar	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Necesita reparación	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Personal no capacitado	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Retirado	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Especifique otra razón y número de equipos	Número de equipos para los cuales se contrató un servicio de mantenimiento	Número de equipos a los que se les hizo mantenimiento en el 2017
Alere Pima Analyzer	1	1	0	0	0	0	0	0		1	1

Otras tecnologías para pruebas de CD4

Tipo de máquina	Número de equipos de laboratorio	Número de laboratorios o establecimientos de salud donde están instalados los equipos de laboratorio	Número total de equipos que no están en uso	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Sin reactivos	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Sin instalar	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Necesita reparación	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Personal no capacitado	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Retirado	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Especifique otra razón y número de equipos	Número de equipos para los cuales se contrató un servicio de mantenimiento	Número de equipos a los que se les hizo mantenimiento en el 2017
-----------------	----------------------------------	--	---	---	--	---	--	--	--	--	--

Tecnologías para pruebas de carga viral

	Número de equipos de laboratorio	Número de laboratorios o establecimientos de salud donde están instalados los equipos de laboratorio	Número total de equipos que no están en uso	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Sin reactivos	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Sin instalar	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Necesita reparación	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Personal no capacitado	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Retirado	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Especifique otra razón y número de equipos	Número de equipos para los cuales se contrató un servicio de mantenimiento	Número de equipos a los que se les hizo mantenimiento en el 2017
Abbott RealTime HIV-1 assay (A) /manual/m2000rt	1	1	0	0	0	0	0	0		1	1
Abbott RealTime HIV-1 assay (A) /m24/m2000rt	1	1	0	0	0	0	0	0		1	1

(A) - Ensayos utilizadas para medir niveles de ARN del VIH-1 (carga viral)

(B) - Ensayos utilizados para la detección calitativa de ARN y AND del VIH-1 en adultos y niños (inclusive menores de 18 meses de edad).

Por favor enumere más abajo otras tecnologías virológicas que se utilicen en su país pero no enumeradas en la tabla (especifique.)

Tipo de máquina	Número de equipos de laboratorio	Número de laboratorios o establecimientos de salud donde están instalados los equipos de laboratorio	Número total de equipos que no están en uso	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Sin reactivos	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Sin instalar	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Necesita reparación	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Personal no capacitado	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Retirado	Número de equipos de laboratorio que no están en uso: Especifique otra razón y número de equipos	Número de equipos para los cuales se contrató un servicio de mantenimiento	Número de equipos a los que se les hizo mantenimiento en el 2017
-----------------	----------------------------------	--	---	---	--	---	--	--	--	--	--

5 Metas del país con fines de proyección

Pregunta 28. En el cuadro siguiente, informe sobre las metas nacionales para los próximos cinco (5) años en materia de tratamiento antirretroviral, prevención de la transmisión materno-infantil de la infección por el VIH y pruebas de laboratorio.

Meta del país

	A fines del 2018	A fines del 2019	A fines del 2020	A fines del 2021	A fines del 2022	A fines del 2023
1. Número de adultos y niños que reciben TAR	40000	43880	52927	54130	55326	56535
1.1 : Número de adultos y adolescentes ≥10 años que reciben TAR						
1.2 : Número de niños <10 años que reciben TAR						
1.2.1 : Número de niños <5 años que reciben TAR						
1.2.2 : Número de niños de 5 a <10 años que reciben TAR						
2. Número total de embarazadas que iniciaron TAR para la PTMI del VIH	850	850	900	900	900	900
2.1 : Número de embarazadas en Opción B+	850	850	900	900	900	900
2.2 : Número de embarazadas en Opción B						
2.3 : Número de embarazadas en Opción A						
3. Número total de personas a las que se le realizará la prueba del VIH						
4. Número total de personas a las que se le realizará la prueba de CD4	42000	44000	46000	48000	50000	52000
5. Número total de personas a las que se le realizará la prueba de carga viral	42000	44000	46000	48000	50000	52000
6. Número total de niños nacidos de madres VIH positivas a los que se les realizará la prueba de diagnóstico temprano	850	850	900	900	900	900
7. Número total de pruebas serológicas del HIV	1401504	1500000	1550000	1600000	1650000	1700000
8. Número de pruebas de CD4	43000	44500	46000	48500	51000	53000
9. Número de pruebas de carga viral	43000	44500	46000	48500	51000	53000
10. Número de pruebas de diagnóstico temprano en niños menores de 12 meses	1020	1020	1080	1080	1080	1080

Pregunta 29: En el cuadro siguiente, informar los esquemas de tratamiento con antirretrovirales para los siguientes tres años.

Adultos

Primera línea de tratamiento antirretroviral

Esquema	Número de personas con dicha línea - 2018	Número de personas con dicha línea - 2019	Número de personas con dicha línea - 2020
---------	---	---	---

Segunda línea de tratamiento antirretroviral

Esquema	Número de personas con dicha línea - 2018	Número de personas con dicha línea - 2019	Número de personas con dicha línea - 2020
---------	---	---	---

Tercera línea de tratamiento antirretroviral

Esquema	Número de personas con dicha línea - 2018	Número de personas con dicha línea - 2019	Número de personas con dicha línea - 2020
---------	---	---	---

Pregunta 30: Si el esquema de la prevención de la transmisión materno-infantil de la infección por el VIH no está incluida en el cuadro anterior, por favor, liste los esquemas y el número de personas para el 2018-2020.

Esquema antirretroviral para la prevención de la transmisión materno infantil del VIH	Número de personas con esquema antirretroviral - 2018	Número de personas con esquema antirretroviral - 2019	Número de personas con esquema antirretroviral - 2020
---	---	---	---

Total

	Número de personas con esquema antirretroviral - 2018	Número de personas con esquema antirretroviral - 2019	Número de personas con esquema antirretroviral - 2020
Total			

Pregunta 31. En el cuadro siguiente por favor informar de los esquemas para los siguientes tres años de tratamiento antirretroviral en niños.

Tratamiento antirretroviral en niños

Primera línea de tratamiento antirretroviral

Esquema	Número de personas con dicha línea - 2018	Número de personas con dicha línea - 2019	Número de personas con dicha línea - 2020
---------	---	---	---

Segunda línea de tratamiento antirretroviral

Esquema	Número de personas con dicha línea - 2018	Número de personas con dicha línea - 2019	Número de personas con dicha línea - 2020
---------	---	---	---

Tercera línea de tratamiento antirretroviral

Esquema	Número de personas con dicha línea - 2018	Número de personas con dicha línea - 2019	Número de personas con dicha línea - 2020
---------	---	---	---

Total

	Número de personas con esquema antirretroviral - 2018	Número de personas con esquema antirretroviral - 2019	Número de personas con esquema antirretroviral - 2020
Total			

Question 32. En el cuadro siguiente informar sobre el pronóstico nacional en los tres años siguientes, prueba de Diagnóstico de VIH (pruebas rápidas y auto-test), CD4, carga viral y diagnóstico temprano infantil.

Número de pruebas realizadas en el 2017 y previstas para los próximos 3 años

	Pruebas realizadas en 2017	Pruebas realizadas en 2018	Pruebas realizadas en 2019	Pruebas previstas para 2020
Diagnóstico de VIH (pruebas rápidas y auto-test)	747527			
CD4 test	41024			
Carga viral	42273			
Diagnóstico temprano infantil de VIH	1138			

Pregunta 33. Por favor informe de las cantidades del tratamiento antirretroviral obtenido en el 2016 y en el 2017, reportado en este cuestionario

Esquemas de tratamiento (dosis)

	Unidades de medida	Número total comprado - 2016	Número total comprado - 2017
--	--------------------	------------------------------	------------------------------

Otras, especificar

Esquemas de tratamiento	Dosis	Unidades de medida	Número total comprado - 2016	Número total comprado - 2017
-------------------------	-------	--------------------	------------------------------	------------------------------