

# GARPR Online Reporting Tool

República Dominicana - 2011

## 1 Reducir a la mitad el número de transmisiones sexuales del VIH para 2015

### A Población general

#### 1.1 Jóvenes: conocimientos sobre la prevención del VIH

Es el indicador/tema pertinente?: Sí

Están los datos disponibles?: Sí

Otra herramienta/fuente de medición: Encuesta demográfica - Encuesta de demografía y salud

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha: 03/15/2007

Hasta la fecha: 08/08/2007

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: GARPR

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta: 55170

#### Respuestas correctas a las cinco preguntas

	Todo (15-24)	Todos los hombres (15-24)	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Todas las mujeres (15-24)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de entrevistados de 15 a 24 años que respondió correctamente a las cinco preguntas	37.32	33.70	32.60	35.19	40.80	39.30	42.60
<b>Numerador :</b> Número de entrevistados de 15 a 24 años que respondió correctamente a las cinco preguntas	7381	3265	1830	1434	4116	2193	1921
<b>Denominador :</b> Número total de entrevistados de 15 a 24 años	19778	9689	5614	4075	10089	5580	4509

**Respuestas correctas a la pregunta 1: "¿Se puede reducir el riesgo de transmisión del VIH manteniendo relaciones sexuales con una única pareja no infectada que no tiene otras parejas?"**

	Todo (15-24)	Todos los hombres (15-24)	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Todas las mujeres (15-24)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de entrevistados que respondió correctamente a la pregunta 1	87.19	87.70	86.80	89.01	86.70	86.09	87.40
<b>Numerador :</b> Numerador: número de entrevistados/población que respondió correctamente a la pregunta 1	17244	8497	4873	3627	8747	4804	3941
<b>Denominador :</b> Número total de entrevistados de 15 a 24 años	19778	9689	5614	4075	10089	5580	4509

**Respuestas correctas a la pregunta 2: "¿Puede reducirse el riesgo de contraer el VIH usando preservativos cada vez que se mantienen relaciones sexuales?"**

	Todo (15-24)	Todos los hombres (15-24)	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Todas las mujeres (15-24)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de entrevistados que respondió correctamente a la pregunta 2	86.85	89.30	88.99	89.69	84.50	84.80	84.21
<b>Numerador :</b> Número de entrevistados/población que respondió correctamente a la pregunta 2	17177	8652	4996	3655	8525	4732	3797
<b>Denominador :</b> Número total de entrevistados de 15 a 24 años	19778	9689	5614	4075	10089	5580	4509

**Respuestas correctas a la pregunta 3: "¿Puede una persona de aspecto saludable tener el VIH?"**

	Todo (15-24)	Todos los hombres (15-24)	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Todas las mujeres (15-24)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de entrevistados que respondió correctamente a la pregunta 3	91.77	90.60	88.99	92.81	92.90	91.70	94.30
<b>Numerador :</b> Número de entrevistados/población que respondió correctamente a la pregunta 3	18151	8778	4996	3782	9373	5117	4252
<b>Denominador :</b> Número total de entrevistados de 15 a 24 años	19778	9689	5614	4075	10089	5580	4509

**Respuestas correctas a la pregunta 4: "¿Se puede contraer el VIH por picaduras de mosquito?" (u otra pregunta específica del país)**

	Todo (15-24)	Todos los hombres (15-24)	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Todas las mujeres (15-24)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de entrevistados que respondió correctamente a la pregunta 4	57.29	52.90	53.40	52.29	61.50	60.90	62.21
<b>Numerador :</b> Número de entrevistados/población que respondió correctamente a la pregunta 4	11330	5125	2998	2131	6205	3398	2805
<b>Denominador :</b> Número total de entrevistados de 15 a 24 años	19778	9689	5614	4075	10089	5580	4509

**Respuestas correctas a la pregunta 5: "Se puede contraer el VIH por compartir alimentos con una persona infectada?" (u otra pregunta específica del país)**

	Todo (15-24)	Todos los hombres (15-24)	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Todas las mujeres (15-24)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de entrevistados que respondió correctamente a la pregunta 5	74.41	69.20	69.10	69.30	79.40	78.60	80.51
<b>Numerador :</b> Número de entrevistados/población que respondió correctamente a la pregunta 5	14716	6705	3879	2824	8011	4386	3630
<b>Denominador :</b> Número total de entrevistados de 15 a 24 años	19778	9689	5614	4075	10089	5580	4509

## 1.2 Relaciones sexuales antes de los 15 años de edad

**Es el indicador/tema pertinente ?:** Sí

**Están los datos disponibles ?:** Sí

**Otra herramienta/fuente de medición:** Encuesta demográfica - Encuesta de demografía y salud

**Otra herramienta/fuente de medición:**

**Desde la fecha:** 03/15/2007

**Hasta la fecha:** 08/08/2007

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::**

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::** GARPR

**Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:** 55170

	Todo (15-24)	Todos los hombres (15-24)	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Todas las mujeres (15-24)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de mujeres y hombres jóvenes con edades comprendidas entre los 15 y los 24 años que tuvo su primera relación sexual antes de los 15 años	19.16	23.50	21.07	26.85	15.00	14.00	16.23
<b>Numerador :</b> Número de entrevistados (de 15 a 24 años) que declara haber tenido su primera relación sexual antes de los 15 años	3790	2277	1183	1094	1513	781	732
<b>Denominador :</b> Número total de entrevistados de 15 a 24 años	19778	9689	5614	4075	10089	5580	4509

### 1.3 Múltiples parejas sexuales

**Es el indicador/tema pertinente ?:** Sí

**Están los datos disponibles ?:** Sí

**Otra herramienta/fuente de medición:** Encuesta demográfica - Encuesta de demografía y salud

**Otra herramienta/fuente de medición:**

**Desde la fecha:** 03/15/2007

**Hasta la fecha:** 08/08/2007

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::**

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::** GARPR

**Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:** 55170

	Todo	Hombres (todas las edades)	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Hombres (25-49)	Mujeres (todas las edades)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)	Mujeres (25-49)
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de mujeres y hombres con edades comprendidas entre los 15 y los 49 años que ha tenido relaciones sexuales con más de una pareja en los últimos 12 meses	17.02	30.30	33.49	42.59	26.77	4.00	8.30	7.31	2.39
<b>Numerador :</b> Número de entrevistados de 15 a 49 años que tuvo relaciones sexuales con más de una pareja en los últimos 12 meses	6793	5987	761	1465	3761	806	455	253	350
<b>Denominador :</b> Número total de entrevistados de 15 a 49 años	39904	19759	2272	3440	14047	20145	5480	3463	14665

#### 1.4 Uso del preservativo entre personas con múltiples parejas sexuales durante la última relación sexual

Es el indicador/tema pertinente ? : Sí

Están los datos disponibles ? : Sí

Otra herramienta/fuente de medición: Encuesta demográfica - Encuesta de demografía y salud

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha: 03/15/2007

Hasta la fecha: 08/08/2007

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: GARPR

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta: 55170

	Todo	Hombres (todas las edades)	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Hombres (25-49)	Mujeres (todas las edades)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)	Mujeres (25-49)
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de mujeres y hombres con edades comprendidas entre los 15 y los 49 años que ha tenido más de una pareja sexual en los últimos 12 meses y declara haber utilizado un preservativo durante su última relación sexual	43.81	45.00	71.62	56.72	42.26	34.95	37.25	31.35	36.21
<b>Numerador :</b> Número de entrevistados de 15 a 49 años de edad que declaró haber tenido más de una pareja sexual en los últimos 12 meses y haber usado un preservativo durante la última relación sexual	2977	2696	545	831	1591	281	76	79	126
<b>Denominador :</b> Número de entrevistados (de 15 a 49 años de edad) que declaró haber tenido más de una pareja sexual en los últimos 12 meses	6795	5991	761	1465	3765	804	204	252	348

## 1.5 Pruebas del VIH en la población general

**Es el indicador/tema pertinente ?:** Sí

**Están los datos disponibles ?:** Sí

**Otra herramienta/fuente de medición:** Encuesta demográfica - Encuesta de demografía y salud

**Otra herramienta/fuente de medición:**

**Desde la fecha:** 03/15/2007

**Hasta la fecha:** 08/08/2007

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::**

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::** GARPR

**Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:** 55170

	Todo	Hombres (todas las edades)	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Hombres (25-49)	Mujeres (todas las edades)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)	Mujeres (25-49)
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de mujeres y hombres con edades comprendidas entre los 15 y los 49 años que se realizó la prueba del VIH en los últimos 12 meses y conoce sus resultados	19.59	18.60	5.01	17.30	24.03	20.50	11.79	11.53	22.00
<b>Numerador :</b> Número de entrevistados de 15 a 49 años que se han realizado la prueba del VIH durante los últimos 12 meses y que conocen los resultados	10167	4593	281	705	3607	5574	658	1163	3763
<b>Denominador :</b> Número total de entrevistados de 15 a 49 años, incluidos aquellos que nunca han oído hablar del VIH o el sida	51893	24698	5614	4075	15009	27195	5580	10089	17106

## 1.6 Prevalencia del VIH entre los jóvenes

**Es el indicador/tema pertinente ?:** Sí

**Están los datos disponibles ?:** Sí

**Otra herramienta/fuente de medición:** Encuesta demográfica con pruebas (especifique)

**Otra herramienta/fuente de medición:** DHS

**Desde la fecha:** 05/03/2007

**Hasta la fecha:** 08/08/2007

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::**

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::** GARPR

**Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:**

	Total (15-24)	15-19	20-24
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de jóvenes de entre 15 y 24 años de edad que vive con el VIH	0.32	0.14	0.56
<b>Numerador</b> : Número de personas (de 15 a 24 años) que acude a centros de atención prenatal cuyos resultados en la prueba del VIH son positivos.	60	15	45
<b>Denominador</b> : Número de personas (de 15 a 24 años) que acude a centros de atención prenatal que se realizó la prueba para conocer su estado serológico con respecto al VIH	18578	10537	8041

## B Estimaciones del tamaño de las poblaciones clave

### Profesionales del sexo

¿Ha realizado estimaciones del tamaño de la población en profesionales del sexo?: No

Si la respuesta es sí, ¿cuándo se realizó la última estimación? (año):

Si la respuesta es sí, ¿cuál era la estimación del tamaño de la población?:

**Comentarios (incluya la definición utilizada para la población, el método utilizado para derivar la estimación de su tamaño y las estimaciones específicas de cada lugar en el caso de que se hayan realizado en diferentes emplazamientos) :**

### Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres

¿Ha realizado estimaciones del tamaño de la población en hombres que tienen relaciones sexuales con hombres?: No

Si la respuesta es sí, ¿cuándo se realizó la última estimación? (año):

Si la respuesta es sí, ¿cuál era la estimación del tamaño de la población?:

**Comentarios (incluya la definición utilizada para la población, el método utilizado para derivar la estimación de su tamaño y las estimaciones específicas de cada lugar en el caso de que se hayan realizado en diferentes emplazamientos) :**

### Usuarios de drogas inyectables

¿Ha realizado estimaciones del tamaño de la población en usuarios de drogas inyectables?: No

Si la respuesta es sí, ¿cuándo se realizó la última estimación? (año):

Si la respuesta es sí, ¿cuál era la estimación del tamaño de la población?:

**Comentarios (incluya la definición utilizada para la población, el método utilizado para derivar la estimación de su tamaño y las estimaciones específicas de cada lugar en el caso de que se hayan realizado en diferentes emplazamientos) :**

**Otras poblaciones clave (especifique):**

¿Ha realizado estimaciones del tamaño de la población de otras de poblaciones clave?: No



**Si la respuesta es sí, ¿cuándo se realizó la última estimación? (año):**

**Si la respuesta es sí, ¿cuál era la estimación del tamaño de la población?:**

**Comentarios (incluya la definición utilizada para la población, el método utilizado para derivar la estimación de su tamaño y las estimaciones específicas de cada lugar en el caso de que se hayan realizado en diferentes emplazamientos) :**

## **B.1 Profesionales del sexo**

**Es el indicador/tema pertinente ?:** Sí

**Están los datos disponibles ?:** Sí

**Otra herramienta/fuente de medición:** Otros (especifique la estrategia y el lugar del muestreo)

**Otra herramienta/fuente de medición:** BSS Behavioural Surveillance Survey

**Desde la fecha:** 03/01/2008

**Hasta la fecha:** 06/01/2008

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::**

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::** GARPR

**Definición del caso:**

**Número de emplazamientos:**

**Métodos de muestreo:**

**Descargar el formato para datos de encuesta para un sitio:** [Site-specific-sw.xlsx](#)

**Luego, cargar el formulario completado utilizando el botón "Agregar archivo".**

## **1.7 Profesionales del sexo: programas de prevención**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos.:**

**Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:** 1256

**Respuestas correctas a las dos preguntas**

	Todo	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de profesionales del sexo que respondió "sí" a ambas preguntas	44.27		44.27			
<b>Numerador :</b> Número de profesionales del sexo que respondió "sí" a ambas preguntas	556		556			
<b>Denominador :</b> Número total de profesionales del sexo entrevistados	1256		1256			

### Respuestas correctas a la pregunta 1: "¿Sabe adónde puede dirigirse si desea realizarse una prueba del VIH?"

	Todo	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de profesionales del sexo que respondió "sí" a la pregunta 1						
<b>Numerador :</b> Número de profesionales del sexo que respondió "sí" a la pregunta 1						
<b>Denominador :</b> Número total de profesionales del sexo entrevistados						

### Respuestas correctas a la respuesta 2: "¿Ha recibido preservativos en los últimos 12 meses?"

	Todo	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de profesionales del sexo que respondió "sí" a la pregunta 2						
<b>Numerador :</b> Número de profesionales del sexo que respondió "sí" a la pregunta 2						
<b>Denominador :</b> Número total de profesionales del sexo entrevistados						

## 1.8 Profesionales del sexo: uso del preservativo

Información adicional relacionada con la introducción de datos.:

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta: 1367

	Todo	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de profesionales del sexo que declara haber utilizado un preservativo con su último cliente	80.76		80.76			
<b>Numerador :</b> Número de profesionales del sexo que declaró haber usado un preservativo con su último cliente	1104		1104			
<b>Denominador :</b> Número de profesionales del sexo que declaró haber mantenido relaciones sexuales a cambio de dinero en los últimos 12 meses	1367		1367			

## 1.9 Pruebas del VIH en los profesionales del sexo

Información adicional relacionada con la introducción de datos.:

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta: 1367

	Todo	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de profesionales del sexo que se realizó una prueba del VIH en los últimos 12 meses y conoce los resultados	66.79		66.79			
<b>Numerador :</b> Número de profesionales del sexo que se ha realizado la prueba del VIH en los últimos 12 meses y que conoce los resultados	913		913			
<b>Denominador :</b> Número de profesionales del sexo incluidos en la muestra	1367		1367			

## 1.10 Prevalencia del VIH entre los profesionales del sexo

Información adicional relacionada con la introducción de datos.:

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta: 1300

	Todo	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de profesionales del sexo que vive con el VIH	4.77					
<b>Numerador :</b> Número de profesionales del sexo cuyo resultado en la prueba del VIH fue positivo	62					
<b>Denominador :</b> Número de profesionales del sexo que se realizó la prueba del VIH	1300					

## B.2 Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres

**Es el indicador/tema pertinente ?:** Sí

**Están los datos disponibles ?:** No

**Otra herramienta/fuente de medición:** Otros (especifique la estrategia y el lugar del muestreo)

**Otra herramienta/fuente de medición:**

**Desde la fecha:**

**Hasta la fecha:**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:** El país no cuenta con encuestas que aporten información relacionada con las variables que incluyen este indicador.

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:** GARPR

**Definición del caso:**

**Número de emplazamientos:**

**Métodos de muestreo:**

**Descargar el formato para datos de encuesta para un sitio:** [Site-specific-msm.xlsx](#)

**Luego, cargar el formulario completado utilizando el botón "Agregar archivo".**

### 1.11 Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres: programas de prevención

**Información adicional relacionada con la introducción de datos.:**

**Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:**

**Respuestas correctas a las dos preguntas**

	Todo	<25	25+
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que respondió "sí" a ambas preguntas			
<b>Numerador</b> : Número hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que respondió "sí" a ambas preguntas			
<b>Denominador</b> : Número total de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres entrevistados			

**Respuestas correctas a la pregunta 1: "¿Sabe adónde puede dirigirse si desea realizarse una prueba del VIH?"**

	Todo	<25	25+
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que respondió "sí" a la pregunta 1			
<b>Numerador</b> : Número hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que respondió "sí" a la pregunta 1			
<b>Denominador</b> : Número total de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres entrevistados			

**Respuestas correctas a la respuesta 2: "¿Ha recibido preservativos en los últimos 12 meses?"**

	Todo	<25	25+
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que respondió "sí" a la pregunta 2			
<b>Numerador</b> : Número hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que respondió "sí" a la pregunta 2			
<b>Denominador</b> : Número total de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres entrevistados			

**1.12 Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres: uso del preservativo**

Información adicional relacionada con la introducción de datos.:

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta: 1388

	Todo	<25	25+
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de hombres que declara haber utilizado un preservativo durante su último coito anal con una pareja masculina	65.78		
<b>Numerador</b> : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que declara haber usado un preservativo durante el último coito anal	913		
<b>Denominador</b> : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que declaró haber mantenido un coito anal con una pareja masculina en los últimos seis meses	1388		

### 1.13 Pruebas del VIH en hombres que tienen relaciones sexuales con hombres

**Información adicional relacionada con la introducción de datos.:**

**Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:** 1565

	Todo	<25	25+
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que se realizó una prueba del VIH en los últimos 12 meses y conoce los resultados	32.91		
<b>Numerador</b> : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que se realizó una prueba del VIH durante los últimos 12 meses y conoce los resultados	515		
<b>Denominador</b> : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres incluidos en la muestra	1565		

### 1.14 Prevalencia del VIH entre hombres que tienen relaciones sexuales con hombres

**Información adicional relacionada con la introducción de datos.:**

**Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:** 1400

	Todo	<25	25+
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que vive con el VIH	6.07		
<b>Numerador</b> : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres con resultado positivo en la prueba del VIH	85		
<b>Denominador</b> : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que se realizó la prueba del VIH	1400		

## C Pruebas y orientación

### 1.16 Pruebas de detección del VIH y orientación en mujeres y hombres de 15 años de edad o más

**Mujeres y hombres de 15 años de edad o más**

	Todo (15+)	Hombres (15+)	Mujeres (15+)	Ambos sexos (15-19)	Hombres (15-19)	Mujeres (15-19)	Ambos sexos (20-24)	Hombres (20-24)	Mujeres (20-24)	Ambos sexos (25+)	Hombres (25+)	Mujeres (25+)
<b>Número :</b> Número de personas a las que se les realizó la prueba de detección del VIH y que recibieron orientación en los últimos 12 meses que conocen el resultado												
<b>Número :</b> Personas seropositivas para el VIH del total de personas a las que se les realizó la prueba												

### Embarazadas (del número total anterior)

	Mujeres (15+)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)	Mujeres (25+)
<b>Número :</b> Número de embarazadas de 15 años o más (del número total anterior) a las que se les realizó la prueba y se les brindó orientación en los últimos 12 meses que recibieron el resultado				

## 1.17 Infecciones de transmisión sexual (ITS)

### 1.17.1 Porcentaje de mujeres que acudieron a servicios de atención prenatal a las que se les realizó la prueba de detección de la sífilis

Es el indicador/tema pertinente?: Sí

Están los datos disponibles?: Sí

Otra herramienta/fuente de medición: Otros (especifique)

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: GARPR

¿Son los datos representativos de todo el país?: No

En caso negativo, sírvase describir la representatividad de los datos:

En la primera consulta de atención prenatal

	Total
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de mujeres que acudieron a servicios de atención prenatal a las que se les realizó la prueba de detección de la sífilis en la primera consulta prenatal	
<b>Numerador</b> : Número de mujeres que acudieron a servicios de atención prenatal a las que se les realizó la prueba de detección de la sífilis en la primera consulta prenatal	
<b>Denominador</b> : Número de mujeres que acudieron a servicios de atención prenatal	

### En cualquier consulta de atención prenatal

	Total
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de mujeres que acudieron a servicios de atención prenatal a las que se les realizó la prueba de detección de la sífilis en cualquier consulta prenatal	
<b>Numerador</b> : Número de mujeres atendidas en servicios de atención prenatal a las que se les realizó la prueba de detección de la sífilis en cualquier consulta prenatal	
<b>Denominador</b> : Número de mujeres que acudieron a servicios de atención prenatal	

### 1.17.2 Porcentaje de mujeres atendidas en servicios de atención prenatal que tuvieron un resultado positivo para la sífilis

**Es el indicador/tema pertinente ?:** Sí

**Están los datos disponibles ?:** Sí

**Otra herramienta/fuente de medición:** Otros (especifique)

**Otra herramienta/fuente de medición:**

**Desde la fecha:** 10/14/2009

**Hasta la fecha:** 12/07/2009

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:** En estos momentos, se están haciendo esfuerzos para fortalecer la notificación de Sífilis Materna. Debido a lo antes expuesto para este indicador se utiliza la información de vigilancia centinela: Mediana de prevalencia de la infección por sífilis de 0% con una prevalencia mínima observada de 0% y una máxima de 2.23%. El país tiene como estrategia el manejo sindrómico, por lo cual la notificación de úlcera genital incluye sífilis en mujeres embarazadas.

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:** GARPR

**Tipo de prueba (o pruebas) usada por lo general en su país:**

#### Tabla

	Todo	<25	25+
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de mujeres atendidas en servicios de atención prenatal que tuvieron un resultado positivo para la sífilis	0.00		
<b>Numerador</b> : Número de mujeres atendidas en servicios de atención prenatal que tuvieron un resultado positivo para la sífilis	0		
<b>Denominador</b> : Número de mujeres atendidas en servicios de atención prenatal a las que se les realizó la prueba de la sífilis	320		

### 1.17.3 Porcentaje de mujeres atendidas en servicios de atención prenatal seropositivas para la sífilis que recibieron tratamiento



**Es el indicador/tema pertinente ?:** Sí

**Están los datos disponibles ?:** Sí

**Otra herramienta/fuente de medición:** Otros (especifique)

**Otra herramienta/fuente de medición:**

**Desde la fecha:**

**Hasta la fecha:**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::**

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::** GARPR

**¿Son los datos representativos de todo el país?:** No

**En caso negativo, indique la representatividad de los datos:**

### Tabla

	Total
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de mujeres atendidas en servicios de atención prenatal seropositivas para la sífilis que recibieron tratamiento	
<b>Numerador :</b> Número de mujeres atendidas en servicios de atención prenatal seropositivas para la sífilis que recibieron al menos una dosis de 2,4 mU IM de benzatina bencilpenicilina	
<b>Denominador :</b> Número de mujeres atendidas en servicios de atención prenatal con una prueba serológica positiva para la sífilis	

### 1.17.4 Porcentaje de profesionales del sexo con sífilis activa

**Es el indicador/tema pertinente ?:** Sí

**Están los datos disponibles ?:** Sí

**Otra herramienta/fuente de medición:** Otros (especifique)

**Otra herramienta/fuente de medición:**

**Desde la fecha:** 02/28/2007

**Hasta la fecha:** 08/31/2007

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::** Fuente: 1ra Encuesta de Vigilancia de Comportamiento con Vinculación Serológica en Poblaciones Vulnerables: GTH, TRSX, UD, año 2008

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::** GARPR

**¿Son los datos representativos de todo el país?:** No

**En caso negativo, indique la representatividad de los datos:**

**¿Son estos datos compatibles con la definición de sífilis activa de GARPR (tanto una prueba treponémica como no treponémica positivas)?:** No

**En caso negativo, describa la situación:**

### Tabla

	Total
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de profesionales del sexo con sífilis activa	7.03
<b>Numerador</b> : Número de profesionales del sexo con un resultado positivo para la sífilis	88
<b>Denominador</b> : Número de profesionales del sexo a los que se les realizó la prueba de la sífilis	1251

### 1.17.5 Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres con sífilis activa

**Es el indicador/tema pertinente ?:** Sí

**Están los datos disponibles ?:** Sí

**Otra herramienta/fuente de medición:** Otros (especifique)

**Otra herramienta/fuente de medición:**

**Desde la fecha:** 02/28/2007

**Hasta la fecha:** 08/31/2007

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:** Fuente: 1ra Encuesta de Vigilancia de Comportamiento con Vinculación Serológica en Poblaciones Vulnerables: GTH, TRSX, UD, año 2008

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:** GARPR

**¿Son los datos representativos de todo el país?:** No

**En caso negativo, indique la representatividad de los datos:**

**¿Son estos datos compatibles con la definición de sífilis activa de GARPR (tanto una prueba treponémica como no treponémica positivas)?:** No

**En caso negativo, describa la situación:**

#### Tabla

	Total
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres y que tienen sífilis activa	6.99
<b>Numerador</b> : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres y que tuvieron un resultado positivo para la sífilis	97
<b>Denominador</b> : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres y a los que se les realizó la prueba de la sífilis	1387

## 2 Reducir a la mitad la transmisión del VIH entre los usuarios de drogas inyectables para 2015

### A Usuarios de drogas inyectables

**Es el indicador/tema pertinente ?:** Sí

**Están los datos disponibles ?:** No

**Otra herramienta/fuente de medición:**

**Otra herramienta/fuente de medición:**

**Desde la fecha:**

**Hasta la fecha:**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:** El país solo cuenta como fuente de datos sobre la población de UD con la 1ra encuesta de Vigilancia del comportamiento con vinculación serológica en poblaciones (Gay, trans y otros hombres que tienen sexo con hombres), 2008. En dicha encuesta, del total de 1200 UD entrevistados, solo el 5% es usuario de drogas inyectables, para un

total de 60 UDI. Esta muestra no es representativa para los fines de ninguno de los indicadores relacionados con esta población.

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:** GARPR

**Definición del caso:**

**Número de emplazamientos:**

**Métodos de muestreo:**

**Descargar el formato para datos de encuesta para un sitio:** [Site-specific-pwid.xlsx](#)

**Luego, cargar el formulario completado utilizando el botón "Agregar archivo".**

## 2.1 Usuarios de drogas inyectables: programas de prevención

**Información adicional relacionada con la introducción de datos:**

	Total
Número de agujas y jeringas distribuidas por usuario de drogas inyectables por año y por programa de agujas y jeringas	
<b>Numerador</b> : Número de agujas y jeringas distribuidas en los últimos 12 meses por los Planes Estratégicos Nacionales	
<b>Denominador</b> : 0	

## 2.2 Usuarios de drogas inyectables: uso del preservativo

**Información adicional relacionada con la introducción de datos:**

**Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:**

	Todo	Hombres	Mujeres	<25	25+
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de usuarios de drogas inyectables que afirma haber utilizado preservativo en su última relación sexual					
<b>Numerador</b> : Número de usuarios de drogas inyectables que afirmaron haber utilizado preservativo en su última relación sexual					
<b>Denominador</b> : Número de usuarios de drogas inyectables que afirman haberse inyectado drogas y mantenido relaciones sexuales en el último mes					

## 2.3 Usuarios de drogas inyectables: prácticas de inyección seguras

**Información adicional relacionada con la introducción de datos:**

**Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:**

	Todo	Hombres	Mujeres	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de usuarios de drogas inyectables que afirma haber utilizado equipos de inyección esterilizados la última vez que se inyectó drogas					
<b>Numerador :</b> Número de usuarios de drogas inyectables que afirman haber utilizado equipos de inyección esterilizados la última vez que se inyectaron drogas					
<b>Denominador :</b> Número de usuarios de drogas inyectables que afirman haberse inyectado drogas en el último mes					

## 2.4 Pruebas del VIH en usuarios de drogas inyectables

**Información adicional relacionada con la introducción de datos.:**

**Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:**

	Todo	Hombres	Mujeres	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de usuarios de drogas inyectables que se realizó una prueba del VIH en los últimos 12 meses y conoce los resultados					
<b>Numerador :</b> Número de usuarios de drogas inyectables encuestados que se realizaron las pruebas del VIH en los últimos 12 meses y conocen sus resultados					
<b>Denominador :</b> Número de usuarios de drogas inyectables incluidos en la muestra					

## 2.5 Prevalencia del VIH entre los usuarios de drogas inyectables

**Información adicional relacionada con la introducción de datos.:**

**Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:**

	Todo	Hombres	Mujeres	<25	25+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de usuarios de drogas inyectables que vive con el VIH					
<b>Numerador :</b> Número de usuarios de drogas inyectables que dieron positivo en las pruebas del VIH					
<b>Denominador :</b> Número de usuarios de drogas inyectables que se realizaron las pruebas del VIH					

## 2.6 Número de consumidores de opiáceos

### 2.6a Número estimado de consumidores de opiáceos (inyectables y no inyectables)

Es el indicador/tema pertinente ? : No

Están los datos disponibles ? : No

Otra herramienta/fuente de medición: Otros

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: GARPR

Número estimado de consumidores de opiáceos (inyectables y no inyectables), si está disponible:

### 2.6b Número de personas en tratamiento de sustitución de opiáceos

Es el indicador/tema pertinente ? : No

Están los datos disponibles ? : No

Otra herramienta/fuente de medición: Otros

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: GARPR

Número de personas en tratamiento de sustitución de opiáceos en todos los centros de tratamiento de sustitución de opiáceos:

## 2.7 Número de centros de distribución de agujas y jeringas, y de tratamiento de sustitución de opiáceos

### 2.7a Número de centros del programa de distribución de agujas y jeringas

Es el indicador/tema pertinente?: No

Están los datos disponibles?: No

Otra herramienta/fuente de medición: Otros

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::**

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::** GARPR

**Número de centros del programa de distribución de agujas y jeringas (incluidas las farmacias que proporcionan agujas y jeringas sin costo alguno):**

## **2.7b Número de centros de tratamiento de sustitución de opiáceos**

Es el indicador/tema pertinente?: No

Están los datos disponibles?: No

Otra herramienta/fuente de medición: Otros

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::**

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::** GARPR

**Número de centros de tratamiento de sustitución de opiáceos:**

## **3 Acabar con las nuevas infecciones por el VIH en niños para 2015 y reducir sustancialmente el número de muertes maternas por causas relacionadas con el sida**

### **3.1 Prevención de la transmisión maternoinfantil**

Es el indicador/tema pertinente?: Sí

Están los datos disponibles?: Sí

Otra herramienta/fuente de medición: Otros (especifique)

Otra herramienta/fuente de medición: Numerator ANC/Denominator Estimates

Desde la fecha: 01/01/2011

Hasta la fecha: 12/31/2011

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::** Para 2010, se reporta un total de 965 embarazadas seropositivas en TAR, desagregado de la siguiente manera: TAR embarazadas criterios necesarios=768, y NVP=197; y un denominador para este mismo año de 1,640, para un porcentaje de embarazadas seropositivas que reciben ARV de 59%. Para 2011, las 1520 se desglosan como sigue: TAR embarazadas criterios necesarios=1074, NVP=157). Los datos relativos a las dos categorías restantes (Profilaxis Triple para madre y AZT madre), no estuvieron disponibles al momento de elaborar este Informe. UNAIDS comment: updated denominator from 1520 to 1282 based on Estimates spreadsheet from June 26, 2012.

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::** GARPR

	Valor de datos
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de mujeres embarazadas seropositivas que recibió antirretrovíricos para reducir el riesgo de transmisión maternoinfantil	96.02
<b>Numerador</b> : Número de mujeres embarazadas seropositivas que recibieron antirretrovíricos en los últimos 12 meses para reducir el riesgo de transmisión maternoinfantil durante el embarazo y el parto	1231
1. Iniciaron de la terapia antirretrovírica durante el embarazo	
2. Ya seguían la terapia antirretrovírica antes del embarazo actual	
3. Profilaxis antirretrovírica triple para la madre (componente profiláctico de Opción B de la OMS)	Missing
4. AZT para la madre (componente profiláctico durante el embarazo y el parto de la Opción A de la OMS o directrices de la OMS de 2006)	Missing
5. Monodosis de Nevirapina, únicamente (con o sin cola) <b>Nótese que el valor final publicado para la cobertura de la prevención maternoinfantil no incluye monodosis de nevirapina. Sin embargo, estos datos se recopilan en la herramienta de presentación de informes durante el periodo de retirada progresiva.</b>	157
6. Otras (comente: por ejemplo, régimen específico, sin categorizar, etc.) <b>En el cuadro de Comentario, para las mujeres que reciban "Otro" régimen, describa el régimen antirretrovírico y el número de mujeres que recibe cada categoría de dichos regímenes.</b>	Missing
Si no existen datos desgregados para 1 y 2, facilite el número total de mujeres embarazadas que siguen un tratamiento antirretrovírico de por vida	1074
<b>Denominador</b> : Número estimado de mujeres embarazadas con VIH que dieron a luz en los últimos 12 meses	1282

### 3.1a Prevención de la transmisión maternoinfantil durante el periodo de lactancia

**Es el indicador/tema pertinente ?:** No

**Están los datos disponibles ?:** No

**Otra herramienta/fuente de medición:** Especifique

**Otra herramienta/fuente de medición:**

**Desde la fecha:**

**Hasta la fecha:**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::** Este país tiene como política la alimentación de reemplazo por los 6 primeros meses de vida a los hijos de madres VIH.

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::** GARPR

	Valor de datos
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de mujeres seropositivas que recibe profilaxis antirretrovírica para su salud o la de sus bebés durante el periodo de lactancia	
<b>Numerador</b> : Número de mujeres seropositivas lactantes que recibieron profilaxis antirretrovírica para su salud o la de sus bebés con el fin de reducir la transmisión maternoinfantil durante la lactancia en los últimos 12 meses	
<b>Denominador</b> : Número estimado de mujeres seropositivas lactantes en los últimos 12 meses	

### 3.2 Diagnóstico infantil precoz

**Es el indicador/tema pertinente ?:** Sí

**Están los datos disponibles ?:** Sí

**Otra herramienta/fuente de medición:** Laboratorios de pruebas para el diagnóstico infantil precoz y estimaciones del espectro

**Otra herramienta/fuente de medición:**

**Desde la fecha:** 01/01/2011

**Hasta la fecha:** 03/31/2012

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::** 2010= Numerador 830 Denominador 986 Porcentaje 84% Al comparar los años 2010 y 2011 los datos revelan una disminución, del porcentaje de niños que se realizó la prueba en los dos primeros meses de vida.

Según las fuentes consultadas en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, esto se debió a retrasos en el suministro de los insumos (papel filtro y reactivos), ya que como resultado de dicha situación se realizó un menor número de pruebas en 2011.

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::** GARPR

	Valor de datos
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de hijos de madres seropositivas que recibieron una prueba virológica del VIH en sus dos primeros meses de vida	58.72
<b>Numerador</b> : Número de niños que recibieron una prueba del VIH en sus dos primeros meses de vida, durante el período de presentación de informes. Los niños que recibieron las pruebas solo deben contarse una vez	522
<b>Resultado de la prueba</b> - : Positivo	Missing
<b>Resultado de la prueba</b> - : Negativo	Missing
<b>Resultado de la prueba</b> - : Indeterminado	Missing
<b>Resultado de la prueba</b> - : Rechazado por el laboratorio	Missing
<b>Resultado de la prueba</b> - : Otro	Missing
<b>Denominador</b> : Número de mujeres seropositivas embarazadas que dieron a luz en los últimos 12 meses	889

### 3.3 Transmisión maternoinfantil del VIH (modelada)

**Es el indicador/tema pertinente ?:** Sí

**Están los datos disponibles ?:** Sí

**Otra herramienta/fuente de medición:** Espectro

**Otra herramienta/fuente de medición:**

**Desde la fecha:** 01/01/2011

**Hasta la fecha:** 12/31/2011

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::** El Informe de las estimaciones sugiere una reducción en el número de nuevas infecciones por VIH en la población de 0-14 años, de 195 para 2010 a 133 en 2011. Adicionalmente, se evidencia una reducción en el número estimado de mujeres en necesidad de PNRTV. En términos porcentuales, se evidencia una reducción de 14% a 10%, de nuevos casos de niños infectados por VIH debido a transmisión vertical. Esto pudiera significar que el país ha logrado mayor efectividad en las intervenciones dirigidas a reducir la transmisión de madre-hijo y por tanto la aparición nuevas infecciones pediátricas. De todas formas, se recomienda hacer un estudio específico con datos del programa nacional para poder sustentar esta afirmación.

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::** GARPR

	Valor de datos
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje estimado de infecciones por el VIH en hijos de madres seropositivas que dieron a luz en los últimos 12 meses	10.31
<b>Numerador</b> : Número estimado de niños que se infectarán por el VIH debido a la transmisión maternoinfantil ente los hijos de madres seropositivas nacidos en los 12 meses previos	133
<b>Denominador</b> : Número estimado de mujeres seropositivas que dieron a luz en los 12 meses previos	1290

### 3.4 Porcentaje de embarazadas a las que se les realizó la prueba de detección del VIH y que recibieron el resultado, ya sea durante el embarazo, el parto o el período posparto (<72 horas), incluidas aquellas cuyo estado serológico se conocía previamente

**Es el indicador/tema pertinente ?:** Sí

**Están los datos disponibles ?:** Sí

**Otra herramienta/fuente de medición:** Especifique



**Otra herramienta/fuente de medición:** Numerador: Programatico, Denominador: CONAPOFA

**Desde la fecha:** 01/01/2011

**Hasta la fecha:** 12/31/2011

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::** NO se dispone de la información para lograr el desglose del indicador

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::** GARPR

**Porcentaje (%):** Porcentaje de embarazadas a las que se les realizó la prueba de detección del VIH y que recibieron el resultado, ya sea durante el embarazo, el parto o el período posparto (<72 horas), incluidas aquellas cuyo estado serológico se conocía previamente:

**Numerador:** Número de embarazadas a las que se les realizó la prueba de detección del VIH en los 12 últimos meses y que recibieron el resultado, ya sea durante el embarazo, el parto o el período posparto (<72 horas), incluidas aquellas cuyo estado serológico se conocía previamente

	Valor de datos
Número total de embarazadas a las que se les realizó la prueba (incluidas aquellas que se sabía previamente que eran positivas)	98343
Número total de embarazadas a las que se les realizó la prueba y que recibieron el resultado (incluidas aquellas que se sabía previamente que eran positivas)	94188
Número total de embarazadas que tuvieron un resultado positivo (incluidas aquellas que se sabía previamente que eran positivas)	1279

**a) Número total de embarazadas que acudieron a servicios de atención prenatal a quienes se les realizó la prueba de detección del VIH durante la atención prenatal y recibieron el resultado o sabían que eran seropositivas**

	Valor de datos
Número total de embarazadas a las que se les realizó la prueba (incluidas aquellas que se sabía previamente que eran positivas)	
Número de embarazadas a las que se les realizó la prueba y que recibieron el resultado (incluidas aquellas que se sabía previamente que eran positivas)	
Número de embarazadas que tuvieron un resultado positivo del total anterior (incluidas aquellas que se sabía previamente que eran positivas)	

**a.i) Número de embarazadas que acudieron a servicios de atención prenatal cuyo estado serológico con respecto al VIH no se conocía a las que se les realizó la prueba de detección y que recibieron el resultado**

	Valor de datos
Número de embarazadas a las que se les realizó la prueba	
Número de embarazadas a las que se les realizó la prueba y que recibieron el resultado	
Embarazadas seropositivas para el VIH del total a las que se les realizó la prueba	

**a.ii) Número de embarazadas con un estado seropositivo para el VIH conocido que acudieron a servicios de atención prenatal por un nuevo embarazo**

	Valor de datos
Número de embarazadas seropositivas para el VIH	

**b) Número de embarazadas que acudieron a servicios de atención del parto cuyo estado serológico se desconocía a las que se les realizó la prueba durante el parto y que recibieron el resultado**

	Valor de datos
Número de embarazadas a las que se les realizó la prueba	
Número de embarazadas a las que se les realizó la prueba y que recibieron el resultado	
Embarazadas seropositivas para el VIH del total a las que se les realizó la prueba	

**c) Número de mujeres con estado serológico desconocido con respecto al VIH que acudieron a servicios de posparto en las 72 horas siguientes al parto a las que se les realizó la prueba de detección y que recibieron el resultado**

	Valor de datos
Número de mujeres a las que se les realizó la prueba	
Número de mujeres a las que se les realizó la prueba y que recibieron el resultado	
Mujeres seropositivas para el VIH del número anterior	

**Denominador: Número estimado de embarazadas:** 226414

**3.5 Porcentaje de embarazadas atendidas en servicios de atención prenatal a cuyo compañero se le realizó la prueba de detección del VIH en los últimos 12 meses**

**Es el indicador/tema pertinente ?:** Sí

**Están los datos disponibles ?:** No

**Otra herramienta/fuente de medición:** Especifique

**Otra herramienta/fuente de medición:**

**Desde la fecha:**

**Hasta la fecha:**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::**

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::** GARPR

	Valor de datos
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de embarazadas atendidas en servicios de atención prenatal a cuyo compañero se le realizó la prueba del VIH en los últimos 12 meses	
<b>Numerador :</b> Número de embarazadas atendidas en servicios de atención prenatal a cuyo compañero se le realizó la prueba del VIH en los últimos 12 meses	
<b>Denominador :</b> Número de embarazadas atendidas en servicios de atención prenatal	

**3.6 Porcentaje de embarazadas seropositivas para el VIH a las que se les realizó una prueba de CD4**

**Es el indicador/tema pertinente ?:** Sí

**Están los datos disponibles ?:** Sí

**Otra herramienta/fuente de medición:** Especifique

**Otra herramienta/fuente de medición:** Base de datos Programa Nacional

**Desde la fecha:** 01/01/2011

**Hasta la fecha:** 12/31/2011

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::** Al momento de elaborar este informe no se contaba con la información a nivel nacional; por lo que datos de un centro de referencia nacional se utilizaron para desarrollar la estimación que aparece abajo.

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::** GARPR

	Valor de datos
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de embarazadas seropositivas para el VIH que se evaluaron para determinar si reunían los criterios para el TAR mediante estadificación clínica o prueba de CD4	30%
<b>Numerador</b> : Número de embarazadas seropositivas para el VIH que se evaluaron para determinar si reunían los requisitos para el TAR	217
<b>Desglose por método de evaluación</b> : Estadificación clínica solamente	217
<b>Desglose por método de evaluación</b> : Prueba de CD4 <b>Women who were assessed both by CD4 testing and by clinical staging should be counted only once, as having been assessed by CD4 testing.</b>	
<b>Denominador</b> : Número estimado de embarazadas seropositivas para el VIH	722

### 3.7 Lactantes nacidos de madres seropositivas para el VIH que recibieron profilaxis antirretroviral para prevenir la transmisión materno-infantil en las primeras 6 semanas de vida

**Es el indicador/tema pertinente ?:** Sí

**Están los datos disponibles ?:** Sí

**Otra herramienta/fuente de medición:** Especifique

**Otra herramienta/fuente de medición:** Base de dato programa nacional

**Desde la fecha:** 01/01/2011

**Hasta la fecha:** 12/31/2011

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::**

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::** GARPR

	Valor de datos
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de lactantes nacidos de madres seropositivas para el VIH (lactantes expuestos al VIH) que recibieron profilaxis antirretroviral para reducir el riesgo de TMI temprana en las 6 primeras semanas (es decir, transmisión posparto temprana alrededor de las 6 semanas de edad) <b>Note. Ideally countries should capture the percentage of infants who received ARV prophylaxis. If this is not possible then countries should record the percentage of infants who were started on or provided with ARV prophylaxis.</b>	54.2%
<b>Numerador</b> : Número de lactantes nacidos de madres seropositivas para el VIH que recibieron profilaxis antirretroviral para reducir el riesgo de TMI temprana en las 6 primeras semanas (transmisión posparto temprana en las primeras 6 semanas)	824
<b>Denominador</b> : Número estimado de embarazadas seropositivas para el VIH que dieron a luz	1520

### 3.9 Porcentaje de lactantes nacidos de madres seropositivas para el VIH que comenzaron la profilaxis con cotrimoxazol dentro de los dos meses de vida

**Es el indicador/tema pertinente ?:** Sí

**Están los datos disponibles ?:** Sí

**Otra herramienta/fuente de medición:** Especifique

**Otra herramienta/fuente de medición:** Numerador: Informacion programatica, denominador: Spectrum

**Desde la fecha:** 07/01/2011

**Hasta la fecha:** 12/31/2011

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::** Esta actividad es continua en los servicios clínicos de atención pediátrica del VIH en el país; a pesar de la importancia de la recolección de la información, no se contaba con instrumento estandarizado para la

recoleccion y notificacion de la informacion. El cual comenzo a circular a partir de la información señalada arriba.

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::** GARPR

	Valor de datos
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de lactantes nacidos de madres seropositivas para el VIH que comenzaron profilaxis con cotrimoxazol (CTX) dentro de los dos meses de vida <b>Note. Ideally countries should capture the percentage of infants who received ARV prophylaxis. If this is not possible then countries should record the percentage of infants who were started on or provided with ARV prophylaxis.</b>	7.76
<b>Numerador :</b> Número de lactantes nacidos de madres seropositivas para el VIH que comenzaron profilaxis con cotrimoxazol dentro de los dos meses de vida	118
<b>Denominador :</b> Número estimado de embarazadas seropositivas para el VIH que dieron a luz	1520

### 3.10 Distribución de las prácticas de alimentación en los lactantes nacidos de madres seropositivas para el VIH en la consulta para la vacunación con la 3era dosis de DTP.

**Es el indicador/tema pertinente ?:** Sí

**Están los datos disponibles ?:** Sí

**Otra herramienta/fuente de medición:** Especifique

**Otra herramienta/fuente de medición:** Base de datos Programa Nacional de VIH

**Desde la fecha:** 01/01/2011

**Hasta la fecha:** 12/31/2011

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::**

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::** GARPR

#### Distribución por práctica de alimentación

	Valor de datos
Lactancia materna exclusiva	
Número estimado de embarazadas seropositivas para el VIH que dieron a luz	819
Alimentación mixta o de otro tipo	
Sin clasificar o de otro tipo	

**Número de lactantes nacidos de madres seropositivas para el VIH a los que se les realizó la prueba de detección y cuyas prácticas de alimentación se registraron en la consulta para la vacunación con 3a dosis de DTP.:**

### 3.11 Número de embarazadas que acudieron a los servicios de atención prenatal al menos una vez durante el período de notificación

**Es el indicador/tema pertinente ?:** Sí

**Están los datos disponibles ?:** Sí

**Otra herramienta/fuente de medición:** Especifique

**Otra herramienta/fuente de medición:** DHS

**Desde la fecha:** 03/08/2007

**Hasta la fecha:** 08/08/2007

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::** Esta informacion se extrae de la Encuesta Demografica y de Salud, que publica que el 98% de las embarazadas reciben al menos 4 consultas prenatales durante el embarazo. Por el estimado de CONAPOFA para Partos (226,414)

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::** GARPR

**Número de embarazadas que acudieron a los servicios de atención prenatal al menos una vez durante el período de notificación:** 221886

## **4 Facilitar tratamiento antirretrovírico capaz de salvar vidas a 15 millones de personas que viven con el VIH para 2015**

### **4.1 Tratamiento del VIH: terapia antirretrovírica**

**Es el indicador/tema pertinente ?:** Sí

**Están los datos disponibles ?:** Sí

**Otra herramienta/fuente de medición:** Registros de pacientes que reciben terapia antirretrovírica y estimaciones de las clínicas de atención prenatal

**Otra herramienta/fuente de medición:**

**Desde la fecha:** 12/31/2011

**Hasta la fecha:**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::** Numerador= 2010 (Niños= 873 y Adultos=12,912) 2011 (Niños= 1010 y Adultos=19,237) Denominador= 2010: <15= 1,990 (1,010 hombres y 980 mujeres) 15+= 19,940 (8,533 hombres y 11,407 mujeres) Total: 21,930 (9,543 hombres y 12,387 mujeres) 2011: <15= 1,870 (950 hombres y 920 mujeres) 15+= 20,900 (8,860 hombres y 12,040 mujeres) Total: 22,770 (9,810 hombres y 12,960 Mujeres) Porcentaje= 2010= Niños 44% y Adultos 65% 2011= Niños 54% y Adultos 92% La mejora en la capacidad de reporte de los SRS ha facilitado un aumento en la notificación, como resultado del apoyo técnico y financiero recibido para tales fines, y la documentación de compromisos específicos con metas definidas para sus intervenciones, en el marco de los convenios de gestión suscritos entre el MSP y los SRS. UNAIDS comment: updated 15+ denominator from 20900 to 23426 and <15 denominator from 1870 to 1839 based on Estimates spreadsheet from June 26, 2012. UNAIDS comment: updated denominator value for All Adults and Children from 22770 to 25265, values based on the UNAIDS PREP spreadsheet from August 2012.

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::** GARPR

### **Porcentaje total y desglosado por sexo**

	Total	Hombres	Mujeres	Sexo desconocido
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de adultos y niños que recibe actualmente tratamiento antirretrovírico de entre todos los adultos y niños que viven con el VIH	80.14			
<b>Numerador</b> : Número de adultos y niños que reciben actualmente tratamiento antirretrovírico según el protocolo de tratamiento aprobado a nivel nacional (o normativa de la OMS) a finales del periodo de presentación de informes.	20247			
<b>Denominador</b> : Número estimado de adultos y niños que viven con el VIH <b>Los criterios nacionales sobre la elegibilidad para recibir tratamiento antirretrovírico varían de unos países a otros. Para que este indicador sea comparable entre países, los informes mundiales presentarán la cobertura del tratamiento antirretrovírico para adultos y niños como un porcentaje de todas las personas que viven con el VIH.</b>	25265			
<b>Denominador</b> : Número estimado de adultos y niños elegibles (utilizando los criterios nacionales de elegibilidad)				
<b>Número</b> : Personas que han iniciado por primera vez el tratamiento antirretrovírico durante el último año de presentación de informes				

### Desglosado por grupo etario

	<15 (si no se dispone de valores disgregados)	15+ (si no se dispone de valores disgregados)	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	15-49	50+	Edad desconocida
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de adultos y niños que recibe actualmente tratamiento antirretrovírico de entre todos los adultos y niños que viven con el VIH. El porcentaje se basa en el Denominador 1.	54.92	82.12									
<b>Numerador :</b> Número de adultos y niños que reciben actualmente tratamiento antirretrovírico según el protocolo de tratamiento aprobado a nivel nacional (o normativa de la OMS) a finales del periodo de presentación de informes.	1010	19237									
<b>Denominador 1 :</b> Número estimado de adultos y niños que viven con el VIH.	1839	23426									
<b>Denominador 2 :</b> Número estimado de adultos y niños elegibles (utilizando los criterios nacionales de elegibilidad). Los criterios nacionales sobre la elegibilidad para recibir tratamiento antirretrovírico varían de unos países a otros. Para que este indicador sea comparable entre países, los informes mundiales presentarán la cobertura del tratamiento antirretrovírico para adultos y niños como un porcentaje de todas las personas que viven con el VIH.											

Número : Personas que han iniciado por primera vez el tratamiento antirretrovírico durante el último año de presentación de informes											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### Desglosado por sector

	Sector público	Sector privado
<b>Numerador</b> : Número de adultos y niños que reciben actualmente tratamiento antirretrovírico según el protocolo de tratamiento aprobado a nivel nacional (o normativa de la OMS) a finales del período de presentación de informes.	19237	

## 4.2a Tratamiento del VIH: retención en el tratamiento 12 meses después de iniciarlo

**Es el indicador/tema pertinente ?:** Sí

**Están los datos disponibles ?:** Sí

**Otra herramienta/fuente de medición:** Registros de pacientes que reciben terapia antirretrovírica

**Otra herramienta/fuente de medición:**

**Desde la fecha:** 01/01/2011

**Hasta la fecha:** 12/31/2011

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::** Conforme al reporte presentado, para 2010 un total de 1195 personas seguían en terapia a 12 meses de iniciar su tratamiento, y para 2011, 1152. Estos datos revelan una retención en terapia de 87% para 2010 y 82% para 2011. Al valorar el comportamiento del indicador por edad, se evidencia un mayor porcentaje de niños que se mantienen en terapia para 2011 en comparación con 2010 (73% vs. 63%), y una reducción en el porcentaje de adultos (2010= 88% vs. 2011= 82%). En términos generales, la retención en terapia muestra un aumento de 2009 a 2010 y una reducción de 2010 a 2011. No fue posible establecer comparación entre 2008-2009 y 2010 y 2011 por edad, ya que la línea de base no tiene el desglose requerido. Es importante puntualizar que los datos correspondientes al año 2011 están en proceso de validación por parte del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social -MSP-, de manera que los datos que se presentan en este indicador para 2011 son preliminares.

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::** GARPR

**Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:** 1403



	Total	Hombres	Mujeres	<15	15+	Estado de embarazo al iniciar la terapia	Estado de lactancia al iniciar la terapia
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de adultos y niños seropositivos que se sabe que siguen el tratamiento antirretrovírico 12 meses después de iniciarlo	82.11			73.33	82.30		
<b>Numerador :</b> Número de adultos y niños que siguen con vida y en tratamiento antirretrovírico 12 meses después de iniciarlo	1152			22	1130		
<b>Denominador :</b> Número total de adultos y niños que iniciaron el tratamiento antirretrovírico y que se espera que reciban resultados anuales dentro del periodo de presentación de informes <b>Incluidos aquellos que han fallecido desde el inicio del tratamiento antirretrovírico, aquellos que abandonaron el tratamiento y aquellos cuyo seguimiento se perdió a partir del mes 12.</b>	1403			30	1373		

**Información adicional: además de las personas que siguen con vida y en terapia antirretrovírica, facilite también información de otros resultados a los 12 meses de iniciar el tratamiento**

**Seguimiento interrumpido:** 251

**Abandono de la terapia:**

**Fallecimiento:**

#### **4.2b Tratamiento del VIH: retención en el tratamiento 24 meses después de iniciarlo**

**Es el indicador/tema pertinente ?:** Sí

**Están los datos disponibles ?:** Sí

**Otra herramienta/fuente de medición:** Especifique

**Otra herramienta/fuente de medición:** Base de dato de Programa Nacional

**Desde la fecha:** 01/01/2011

**Hasta la fecha:** 12/31/2011

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::**

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::** GARPR

**Tamaño de la muestra: Número de personas encuestadas:**

	Total	Hombres	Mujeres	<15	15+	Estado de embarazo al iniciar la terapia	Estado de lactancia al iniciar la terapia
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de adultos y niños seropositivos que se sabe que siguen el tratamiento antirretrovírico 24 meses después de iniciarlo <b>If data on 24-months retention are not available for patients that initiated antiretroviral therapy in 2011 specifically, but available for patients that initiated antiretroviral therapy during an earlier time period (e.g. 2010 or 2009), please specify the period in the comment field above:</b> <b>Started antiretroviral therapy between [month]/[year] and [month]/[year]</b>	81						
<b>Numerador :</b> Número de adultos y niños que siguen con vida y en tratamiento antirretrovírico 24 meses después de iniciarlo	1161						
<b>Denominador :</b> Número total de adultos y niños que iniciaron el tratamiento antirretrovírico y que se espera que reciban resultados de 24 meses dentro del periodo de presentación de informes <b>Incluidos aquellos que han fallecido desde el inicio del tratamiento antirretrovírico, aquellos que abandonaron el tratamiento y aquellos cuyo seguimiento se perdió a partir del mes 24.</b>	1434						

**Información adicional: además de las personas que siguen con vida y en terapia antirretrovírica, facilite también información de otros resultados a los 24 meses de iniciar el tratamiento**

**Seguimiento interrumpido:** 273

**Abandono de la terapia:**

**Fallecimiento:**

#### **4.2c Tratamiento del VIH: retención en el tratamiento 60 meses después de iniciarlo**

**Es el indicador/tema pertinente ?:** Sí

**Están los datos disponibles ?:** No

**Otra herramienta/fuente de medición:** Especifique

**Otra herramienta/fuente de medición:**

**Desde la fecha:**

**Hasta la fecha:**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::**

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::** GARPR

**Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:**

	Total	Hombres	Mujeres	<15	15+	Estado de embarazo al iniciar la terapia	Estado de lactancia al iniciar la terapia
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de adultos y niños seropositivos que se sabe que siguen el tratamiento antirretrovírico 60 meses después de iniciarlo <b>If data on 60-months retention are not available for patients that initiated antiretroviral therapy in 2008 specifically, but available for patients that initiated antiretroviral therapy during an earlier time period (e.g. 2007 or 2006), please specify the period in the comment field above:</b> <b>Started antiretroviral therapy between [month]/[year] and [month]/[year]</b>							
<b>Numerador :</b> Número de adultos y niños que siguen con vida y en tratamiento antirretrovírico 60 meses después de iniciarlo							
<b>Denominador :</b> Número total de adultos y niños que iniciaron el tratamiento antirretrovírico y que se espera que reciban resultados de 60 meses dentro del periodo de presentación de informes <b>Incluidos aquellos que han fallecido desde el inicio del tratamiento antirretrovírico, aquellos que abandonaron el tratamiento y aquellos cuyo seguimiento se perdió a partir del mes 60.</b>							

**Información adicional: además de las personas que siguen con vida y en terapia antirretrovírica, facilite también información de otros resultados a los 60 meses de iniciar el tratamiento**

**Seguimiento interrumpido:**

**Abandono de la terapia:**

**Fallecimiento:**

#### **4.3a Establecimientos de salud que ofrecen TAR**

**Es el indicador/tema pertinente ?:** Sí

Están los datos disponibles?: Sí

Otra herramienta/fuente de medición: Especifique

Otra herramienta/fuente de medición: Programatico

Desde la fecha: 01/01/2011

Hasta la fecha: 12/31/2011

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: GARPR

	Total
Número total de establecimientos de salud que ofrecen TAR (es decir, que prescriben medicamentos o proporcionan seguimiento clínico)	74

Desglose según si es público o privado:

	Valor de datos
Público	52
Privado	22
Desconocido o no especificado	0

Desglose por tipo de centro de salud:

	Valor de datos
Hospital	
Centro de salud	
Centro de atención prenatal	
Servicio de atención de la TB	
Servicio de atención de las ITS	
Desconocido o no especificado	

#### 4.3b Establecimientos de salud que ofrecen TAR pediátrico

Es el indicador/tema pertinente?: Sí

Están los datos disponibles?: Sí

Otra herramienta/fuente de medición: Especifique

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: GARPR

	Total
Número total de establecimientos de salud que ofrecen TAR pediátrico (es decir, que prescriben medicamentos o proporcionan seguimiento clínico)	

Desglose según si es público o privado:

	Valor de datos
Público	
Privado	
Desconocido o no especificado	

#### 4.4 Desabastecimientos de antirretrovirales (ARV)

Es el indicador/tema pertinente?: Sí

Están los datos disponibles?: Sí

Otra herramienta/fuente de medición: Especifique

Otra herramienta/fuente de medición: Programa Nacional de VIH

Desde la fecha: 01/01/2011

Hasta la fecha: 12/31/2011

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::**

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::** GARPR

	Valor de datos
<b>Porcentaje (%)</b> : Porcentaje de establecimientos de salud que dispensan ARV que experimentaron desabastecimiento de por lo menos un ARV necesario en los últimos 12 meses	78.38%
<b>Numerador</b> : Número de establecimientos de salud que dispensan ARV que experimentaron desabastecimiento de uno o varios ARV necesarios en los últimos 12 meses	58
<b>Denominador</b> : Número total de establecimientos de salud que dispensan ARV	74

#### 4.6 Atención de la infección por el VIH

Es el indicador/tema pertinente?: Sí

Están los datos disponibles?: No

Otra herramienta/fuente de medición: Especifique

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::** En la practica todo paciente VIH se se suministra segun protocolo cotrimoxazol, sin embargo la informacion no se notifica desde los servicios. Al momento, se han elaborado nuevos instrumentos que permitira el levantamiento de esta y otras informaciones.

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::** GARPR

	Total	Hombres	Mujeres	Sexo desconocido	<15	15+	Edad desconocida
<b>4.6.a</b> : Número total de adultos y niños incluidos en la atención de la infección por el VIH a fines del período de notificación							
<b>4.6.b</b> : Número de adultos y niños incorporados por primera vez en la atención de la infección por el VIH durante el período de notificación							

## 5 Reducir a la mitad el número de muertes a causa de la tuberculosis entre las personas que viven con el VIH para 2015

### 5.1 Gestión coordinada del tratamiento la tuberculosis y el VIH

**Es el indicador/tema pertinente ?:** Sí

**Están los datos disponibles ?:** Sí

**Otra herramienta/fuente de medición:** Registros y estimaciones sobre pacientes en tratamiento antirretrovírico de la base de datos de Alto a la Tuberculosis de la OMS

**Otra herramienta/fuente de medición:**

**Desde la fecha:** 01/01/2010

**Hasta la fecha:** 12/31/2010

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:** La OMS sólo tiene las estimaciones del año 2010, ya que 2011 todavía no está disponible, no obstante a que el país sí tiene un reporte para 2011 de 430 personas seropositivas que tienen TB y que recibe tratamiento tanto para la TB como para el VIH (Niños 19 y Adultos 411). El dato estimado para 2010, por la OMS para la República Dominicana, presenta un sub-registro importante, ya que el número casos de TB en personas que viven con el VIH en el país es mayor. De todas formas, para este indicador se reporta el denominador aportado por la OMS, en cumplimiento a los requerimientos de ONUSIDA para la elaboración de este Informe.

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:** GARPR

	Total	Hombres	Mujeres	<15	15+
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de casos incidentes de tuberculosis estimados en personas seropositivas que recibieron tratamiento para tuberculosis y VIH	148.26				
<b>Numerador :</b> Number of people with HIV infection who received antiretroviral combination therapy in accordance with the nationally approved treatment protocol (or WHO/UNAIDS standards) and who were started on TB treatment (in accordance with national TB programme guidelines), within the reporting year	811				
<b>Denominador :</b> Número estimado de casos incidentes de tuberculosis en personas que viven con el VIH La OMS realiza estimaciones anuales del número de casos incidentes de tuberculosis en personas que viven con el VIH en países con gran morbilidad de tuberculosis, disponibles en: <a href="http://www.who.int/tb/country/en">http://www.who.int/tb/country/en</a>	547				

### 5.3 Porcentaje de adultos y niños incorporados por primera vez en la atención de la infección por el VIH (que inician profilaxis con isoniazida)

Es el indicador/tema pertinente ? : Sí

Están los datos disponibles ? : No

Otra herramienta/fuente de medición: Especifique

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::** En la practica en el pais se usa la isoniazida como profilactico, sin embargo la infomacion no se registra.

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::** GARPR

	Valor de datos
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de adultos y niños incorporados por primera vez en la atención de la infección por el VIH que inician profilaxis con isoniazida	
<b>Numerador :</b> Número de adultos y niños incorporados por primera vez en la atención de la infección por el VIH (etapa previa y TAR) que además iniciaron (es decir, que recibieron al menos una dosis) la profilaxis con isoniazida durante el período de notificación La atención de la infección por el VIH incluye tanto la etapa previa al tratamiento como el tratamiento antirretroviral.	
<b>Denominador :</b> Número de adultos y niños incorporados por primera vez en la atención de la infección por el VIH durante el período de notificación	

### 5.4 Porcentaje de adultos y niños incluidos en la atención de la infección por el VIH cuyo estado con respecto a la TB se determinó y consignó en la consulta más reciente

Es el indicador/tema pertinente ? : Sí

Están los datos disponibles ? : No



**Otra herramienta/fuente de medición:** Especifique

**Otra herramienta/fuente de medición:**

**Desde la fecha:**

**Hasta la fecha:**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::** En la practica, toda persona con VIH en sus visitas de seguimientos se le realiza tamizaje para descartar TB, sin embargo, esta informaicon no se reporta.

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::** GARPR

	Valor de datos
<b>Porcentaje (%) :</b> Porcentaje de adultos y niños incluidos en la atención de la infección por el VIH cuyo estado con respecto a la TB se determinó y consignó en la consulta más reciente	
<b>Numerador :</b> Número de adultos y niños en la atención de la infección por el VIH cuyo estado con respecto a la TB se determinó y consignó en la consulta más reciente <b>La atención de la infección por el VIH incluye tanto la etapa previa al tratamiento como el tratamiento antirretroviral.</b>	
<b>Denominador :</b> Número total de adultos y niños en atención de la infección por el VIH en el período de notificación	

## 6 Eliminar el déficit mundial de recursos para responder al sida para 2015

### 6.1 Gastos relacionados con el sida

Descargar la Matriz de Financiamiento Nacional vacía, [2013-GARPR-6-1 es.xls](#)

Luego, cargar el formulario completado utilizando el botón "Agregar archivo".

## 7 Acabar con las desigualdades basadas en el género

### 7.1 Prevalencia de la violencia por parte de la pareja íntima reciente

**Es el indicador/tema pertinente ?:** Sí

**Están los datos disponibles ?:** Sí

**Otra herramienta/fuente de medición:** Encuesta demográfica - Encuesta de demografía y salud

**Otra herramienta/fuente de medición:**

**Desde la fecha:** 03/15/2007

**Hasta la fecha:** 08/08/2007

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::**

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::** GARPR

**Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:**

	Mujeres (todas las edades)	Mujeres seropositivas	Mujeres seronegativas	Mujeres (15-19)	Mujeres seropositivas (15-19)	Mujeres seronegativas (15-19)	Mujeres (20-24)	Mujeres seropositivas (20-24)	Mujeres seronegativas (20-24)	Mujeres (25-49)	Mujeres seropositivas (25-49)	Mujeres seronegativas (25-49)
<b>Porcentaje (%) :</b> Proporción de mujeres de entre 15 y 49 años de edad que han estado casadas o tenido pareja en alguna ocasión y que han sufrido violencia física o sexual por parte de una pareja masculina en los últimos 12 meses	11.70											
<b>Numerador :</b> Mujeres de entre 15 y 49 años de edad que tienen o han tenido una pareja sexual y que afirman haber sufrido violencia física o sexual por parte de dicha pareja en los últimos 12 meses	903											
<b>Denominador :</b> Número total de mujeres encuestadas de entre 15 y 49 años de edad que tienen o han tenido una pareja sexual	7719											

## 9 Eliminar las restricciones para viajar

## 10 Reforzar la integración de los programas de VIH

### 10.1 Asistencia escolar de los huérfanos

**Es el indicador/tema pertinente ?:** Sí

**Están los datos disponibles ?:** Sí

**Otra herramienta/fuente de medición:** Otras encuestas demográficas generales

**Otra herramienta/fuente de medición:** ENHOGAR 2009-2010

**Desde la fecha:** 01/01/2010

**Hasta la fecha:** 12/31/2010

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::**

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::** GARPR

## PARTE A

	Todo	Hombres	Mujeres
<b>Porcentaje (%) :</b> Asistencia escolar actual entre niños huérfanos y no huérfanos de 10 a 14 años, edad de escuela primaria, edad de escuela secundaria	95.24		
<b>Numerador :</b> Número de niños de entre 10 y 14 años de edad que han perdido a ambos padres y que asisten a la escuela primera o secundaria	20		
<b>Denominador :</b> Número de niños que han perdido a ambos padres	21		

## PARTE B

	Todo	Hombres	Mujeres
<b>Porcentaje (%) :</b> Índice actual de asistencia escolar de niños de entre 10 y 14 años en la escuela primaria y secundaria, con ambos padres vivos y que conviven con al menos uno de los padres	97.75		
<b>Numerador :</b> Número de niños de entre 10 y 14 años con ambos padres vivos, que conviven con al menos uno de los padres y que acuden a la escuela primaria o secundaria	2735		
<b>Denominador :</b> Número de niños con ambos padres vivos y que conviven con al menos uno de los padres	2798		

## 10.2 Apoyo económico externo a los hogares más pobres

**Es el indicador/tema pertinente ?:** Sí

**Están los datos disponibles ?:** Sí

**Otra herramienta/fuente de medición:** Otros

**Otra herramienta/fuente de medición:** Memorias Anuales 2010 y 2011 de la Administradora de Subsidios Sociales del Gabinete de Política Social

**Desde la fecha:** 01/01/2011

**Hasta la fecha:** 12/31/2011

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::** Las ayudas del Gobierno para los hogares pobres a través del Programa Solidaridad son las siguientes: Comer es Primero, Apoyo Alimenticio al Envejeciente, Incentivo a la Asistencia Escolar y a la Educación Superior, Bonogas y Bonuluz. Estos hogares reciben ayudas adicionales vía otras instituciones del Gobierno mediante el mismo medio de pago que gestiona la Administradora de Subsidios Sociales. Por ejemplo, Plan Básico de Salud, a través del Régimen Subsidiado que administra el SENASA. Se determinan los hogares elegibles en función del nivel de pobreza y esto se determina mediante el levantamiento que realiza el Sistema Único de Beneficiarios -SIUBEN-. El dato reportado en el denominador se refiere a total de hogares pobres que reporta el SIUBEN. Los datos reportados en el numerador se refieren al total de beneficiarios por año, es decir, a personas no a hogares, de manera que es posible que el numerador incluya un hogar más de una vez en los casos que varias personas que una misma familia reciban algún tipo de beneficio.

**Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::**

**Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::** GARPR

	Valor de datos
<b>Porcentaje (%)</b> : Proporción de los hogares más pobres que recibieron ayuda económica externa durante los últimos 3 meses	
<b>Numerador</b> : Número de los hogares más pobres que recibieron cualquier tipo de ayuda económica externa durante los últimos 3 meses <b>El apoyo económico externo se define como una ayuda económica gratuita (subvenciones de efectivo, asistencia para tasas escolares, apoyo material para la educación, apoyo para la generación de ingresos en efectivo o en especie, asistencia alimentaria en los hogares, o apoyo material o económico para alojamiento) que proviene de una fuente alternativa a los amigos, familia o vecinos, a no ser que trabajen en un grupo u organización comunitaria. Lo más probable es que dicha fuente sea el gobierno nacional o una organización de la sociedad civil.</b>	818574
<b>Denominador</b> : Número total de hogares más pobres <b>Los hogares más pobres se definen como aquellos que se encuentran en la parte inferior del quintil de riqueza. Los países deben utilizar la definición del indicador y el método de medición exactos para la supervisión y la presentación de informes sobre los progresos normalizados a nivel nacional y mundial. Esto permitirá hacer un seguimiento de los cambios en el tiempo y comparaciones entre diferentes países. Sin embargo, los países pueden añadir o excluir otras categorías en el plano local (por ejemplo, otros quintiles de riqueza) en función de las necesidades del país con respecto a la planificación y ejecución del programa nacional.</b>	887594